

Tiesinių lygčių sistemų sprendimas Gauss'o metodu. Rimantas Grigutis

1. Išspręskite lygčių sistemas.

$$1) \begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = -4 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -2 \\ 4x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 7x_4 = -2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 3 \end{cases} .$$

$$2) \begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 = 2 \\ 5x_1 + 2x_3 - 2x_4 = 3 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 6x_4 = 5 \end{cases} .$$

$$3) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 3 \end{cases} .$$

2. Raskite n -ojo laipsnio polinomą, jeigu

$$1) n = 3, \quad \begin{array}{|c||c|c|c|c|} \hline x & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline f(x) & -2 & -4 & -2 & 10 \\ \hline \end{array} .$$

$$2) n = 4, \quad \begin{array}{|c||c|c|c|c|c|} \hline x & -2 & 1 & -3 & 2 & -1 \\ \hline f(x) & 10 & 4 & 60 & -10 & -4 \\ \hline \end{array} .$$

$$3) n = 5, f(2) = 5, f'(2) = 19, f^{(2)}(2) = 40, f^{(3)}(2) = 48, f^{(4)}(2) = 24.$$

$$4) n \leq 4, f(1) = -3, f'(1) = -3, f^{(2)}(1) = 12, f^{(3)}(1) = 42, f(-1) = 3.$$

$$5) n \leq 5, f(1) = -2, f'(1) = -7, f^{(2)}(1) = -14, f^{(3)}(1) = 24, f(2) = -4, f'(2) = 25.$$

3. Kiek sprendinių priklausomai nuo parametru λ turi tiesinių lygčių sistema.

Išspręskite sistemą.

$$1) \begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = 1 \\ x + y + \lambda z = 1 \end{cases} . 2) \begin{cases} x + 2y - 3x = 4 \\ 3x - y + 5z = 2 \\ 4x + y + (\lambda^2 - 14)z = \lambda + 2 \end{cases}, \lambda \in \mathbf{Q}.$$

$$3) \begin{cases} \lambda x + y + z + t = 1 \\ x + \lambda y + z + t = 1 \\ x + y + \lambda z + t = 1 \\ x + y + z + \lambda t = 1 \end{cases} . 4) \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 5 \\ 6x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 6x_4 = 7 \\ 8x_1 + 12x_2 + 7x_3 + \lambda x_4 = 9 \end{cases} .$$

$$4. \text{ Išspėskite sistemą} \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ \dots \\ x_{n-2} + x_{n-1} + x_n = 0 \\ x_{n-1} + x_n = 0 \end{cases} .$$

$$5. \text{ Išspėskite sistemą} \begin{cases} x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} + x_n = 0 \\ x_1 + x_3 + \dots + x_{n-1} + x_n = 1 \\ x_1 + x_2 + x_4 + \dots + x_{n-1} + x_n = 0 \\ \dots \\ x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_{n-1} = 0 \end{cases} .$$

6. Su kuriomis λ reikšmėmis lygtis

$$\begin{cases} -\lambda x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \\ x_1 - \lambda x_2 + \dots + x_n = 0 \\ \dots \\ x_1 + x_2 + \dots - \lambda x_n = 0 \end{cases}$$

turi nenulinį sprendinį?

$$7. \text{ Išspėskite sistemą} \begin{cases} (1-n)x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \\ x_1 + (1-n)x_2 + \dots + x_n = 0 \\ \dots \\ x_1 + x_2 + \dots + (1-n)x_n = 0 \end{cases} .$$

8. Išspėskite sistemas pritaikę Cramer'io formules.

$$1) \begin{cases} 2x + y + z = 3 \\ x + 2y + z = 0 \\ x + y + 2z = 9 \end{cases} . 2) \begin{cases} x + y + z = 6 \\ -x + y + z = 0 \\ x - y + z = 2 \end{cases} .$$