

## Algebro pratybos.

Rimantas Grigutis

### 7 pratybos. Poerdviai ir veiksmai su jais

Nagrinjami šie uždaviniai:

1. Homogeninės tiesnių lygčių sistemas(h.t.l.s.) sprendinių poerdvis  $H$ :
  - (i) H.t.l.s. bendarasis sprendinys
  - (ii) Fundamentalioji sprendinių sistema( f.s.s)
  - (iii)  $H$  bazė ir dimensija.
2. Duotai tiesiskai nepriklausomai sistemai surasti h.t.l.s., kurios f.s.s. yra duotoji sistema.
3. Poerdvių sumos bazės ir dimensijos radimas.
4. Poerdvių sankirtos bazės ir dimensijos radimas

1. Gausso metodu sprendžiama homogeninė tiesinių lygčių sistema užrašyta savo išplėstajā matrica:

$$\left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & -2 & 7 & -5 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & -1 & -1 & 0 \\ 7 & 13 & 18 & -31 & 13 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} (-1) \\ | \\ | \\ | \end{matrix}} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -4 & 10 & -6 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 5 & -3 & 0 \\ 0 & 6 & 4 & -10 & 6 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{matrix} | \\ (-2) \\ | \\ | \end{matrix}} \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & 5 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Bendarasis sistemos sprendinys yra

$$\begin{aligned} x_1 &= -\frac{4}{3}x_3 + \frac{4}{3}x_4 \\ x_2 &= -\frac{2}{3}x_3 + \frac{5}{3}x_4 - x_5 \\ x_3 &= x_3 \\ x_4 &= x_4 \\ x_5 &= x_5 \end{aligned}$$

Sprendinių poerdvio H dimensija lygi  $\dim H = n - \text{rank}A = 5 - 2 = 3$ .

Fundamentalioji sprendinių sistema yra poerdvio H bazė, kurią sudaro 3 vektoriai:

$$\left(-\frac{4}{3}; -\frac{1}{2}; 1; 0; 0\right)^T, \left(\frac{4}{3}; \frac{5}{3}; 0; 1; 0\right)^T, \left(0; -1; 0; 0; 1\right)^T.$$

2. Duota tiesiškai nepriklausoma stulpelių sistema :  $\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_n \in \mathbf{R}_n$ . Reikia rasti tokią matricą A iš matricų aibės  $\mathbf{M}_{r \times n}$ , kad

$$\begin{aligned} \text{rank}A &= r \\ A\mathbf{u}_{r+1} &= \dots = A\mathbf{u}_n = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Sprendimas remiasi tokiu teiginiu iš matricų teorijos:

**7.1 Teiginys.** Jei  $B = \underbrace{(C|I_{n-r})}_{n \text{ stulpelių}}$  ir  $A = (I_r| - C^T)$ , tai  $A \cdot B^T = O$ .

Čia  $C \in \mathbf{M}_{(n-r) \times r}$ ,  $C^T \in \mathbf{M}_{r \times (n-r)}$ ,  $B \in \mathbf{M}_{(n-r) \times n}$ ,  $A \in \mathbf{M}_{r \times n}$ .

Norint rasti vektorių sistemai  $\mathbf{u}_{r+1}, \dots, \mathbf{u}_n$  rasti matricą A reikia matricą, sudarytą iš eilučių  $\mathbf{u}_{r+1}^T, \dots, \mathbf{u}_n^T$ , Gauso veiksmais suvesti prie matricos  $B = \underbrace{(C|I_{n-r})}_{n \text{ stulpelių}}$ :

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}_{r+1}^T \\ \vdots \\ \mathbf{u}_n^T \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gausso veiksmai}} \underbrace{(C|I_{n-r})}_{n \text{ stulpelių}} = B.$$

Tada ieškomoji matrica  $A = (I_r| - C^T)$ .

**7.2 Pavyzdys.** Tegu  $\mathbf{u}_3 = (-2; -4; 1; 0; 0)^T$ ,  $\mathbf{u}_4 = (-9; -12; 0; 1; 1)^T$ ,  $\mathbf{u}_5 = (-6; -7; 0; 0; 1)^T$ .

Tada

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}_3^T \\ \mathbf{u}_4^T \\ \mathbf{u}_5^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ -9 & -12 & 0 & 1 & 1 \\ -6 & -7 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[-1]{(-1)} \sim \begin{pmatrix} -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & -7 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B$$

$$\text{čia } n = 5, r = 2 \text{ ir } C = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -3 & -5 \\ -6 & -7 \end{pmatrix}.$$

Tada

$$A = (I_r| - C^T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

ir homogeninė tiesinių lygčių sistema yra

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + 2x_3 + 3x_4 + 6x_5 = 0 \\ x_2 + 4x_3 + 5x_4 + 7x_5 = 0 \end{array} \right.$$

Patikrinimas:

$$\begin{aligned} A \cdot B^T &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -5 & 0 & 1 & 0 \\ -6 & -7 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 4 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ -9 & -12 & 0 & 1 & 1 \\ -6 & -7 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3. Vektorinės erdvės  $\mathbf{R}^n$  poerdvių  $U = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r]$  ir  $W = [\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s]$  sumos bazė yra vektorių sistemas  $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s$  maksimalus tiesiškai nepriklausomas posistemis, kurį galima surasti suvedant matricą

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{u}_r \\ \mathbf{w}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{w}_s \end{pmatrix} \text{ prie laiptuoto pavidalo.}$$

4. Rasime poerdvių  $U = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r]$  ir  $W = [\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s]$  sankirtos bazę.  
Žinime, kad

$$U \cap W = \{\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n : x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_r\mathbf{u}_r = y_1\mathbf{w}_1 + \dots + y_s\mathbf{w}_s\}$$

Norint rasti sankirtos bazę reikia nagrinėti lygtis

$$\begin{aligned} x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_r\mathbf{u}_r &= y_1\mathbf{w}_1 + \dots + y_s\mathbf{w}_s \\ x_1\mathbf{u}_1 + \dots + x_r\mathbf{u}_r + y_1(-\mathbf{w}_1) + \dots + y_s(-\mathbf{w}_s) &= \mathbf{0} \\ (\mathbf{u}_1^T; \dots; \mathbf{u}_r^T; -\mathbf{w}_1^T; \dots; -\mathbf{w}_s^T) \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{x}_r \\ \mathbf{y}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{y}_s \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Tegu paskutinės homogeninės lygčių sistemos fundamentalioji sprendinių sistema yra  $(x_{1i}; \dots; x_{ri}; y_{1i}; \dots; y_{si})$  (sistemoje yra  $t$  vektorių).

Tada  $\dim U \cap W = t$  ir vektorių sistema  $\{\mathbf{v}_i = x_{1i}\mathbf{u}_1 + \dots + x_{ri}\mathbf{u}_r : i = 1, \dots, t\}$  yra  $U \cap W$  bazė. Pastebėkime, kad  $\mathbf{v}_i = y_{1i}\mathbf{w}_1 + \dots + y_{ri}\mathbf{w}_r$

**7.3 Pavyzdys.** Tegu  $\mathbf{u}_1 = (1; 0; 1)$ ,  $\mathbf{u}_2 = (2; -1; 3)$  yra  $U$  bazė, o  $\mathbf{w}_1 = (2; -1; 1)$ ,  $\mathbf{w}_2 = (-3; 0; 4)$  yra  $W$  bazė. Tada sprendžiame homogeninę lygčių sistemą:

$$\begin{aligned} (\mathbf{u}_1^T | \mathbf{u}_2^T | -\mathbf{w}_1^T | -\mathbf{w}_2^T | \mathbf{o}^T) &= \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & -4 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{(-1)} \\ &\sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{|} \sim \left( \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -7 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

Bendrasis sistemos sprendinys yra

$$\begin{aligned} x_1 &= -3x_4 \\ x_2 &= \frac{7}{4}x_4 \\ x_3 &= \frac{7}{2}x_4 \\ x_4 &= x_4 \end{aligned}$$

Fundamentaliajį sprendinių sistemą sudaro vienas sprendinys:  $(-6; 7; 7; 2)$  ir  $\dim U \cap W = 1$ , o sankirtos bazę sudaro vienas vektorius

$$\mathbf{v}_1 = -6\mathbf{u}_1 + 7\mathbf{u}_2 = (8; -7; 15).$$

### Uždaviniai.

1. Raskite homogeninės tiesinių lygčių sistemos sprendinių poerdvio dimensiją ir baze (fundamentalią sprendinių sistemą).

$$\begin{aligned} 1.1) \left\{ \begin{array}{l} 9x_1 + 21x_2 - 15x_3 + 5x_4 = 0 \\ 12x_1 + 28x_2 - 20x_3 + 7x_4 = 0 \end{array} \right. & 1.2) \left\{ \begin{array}{l} 14x_1 + 34x_2 - 7x_3 + 63x_4 = 0 \\ -10x_1 - 25x_2 + 5x_3 + 45x_4 = 0 \\ 26x_1 + 65x_2 - 13x_3 - 117x_4 = 0 \end{array} \right. \\ 1.3) \left\{ \begin{array}{l} 2x_1 - 5x_2 + 4x_3 + 3x_4 = 0 \\ 3x_1 - 4x_2 + 7x_3 + 5x_4 = 0 \\ 4x_1 - 9x_2 + 8x_3 + 5x_4 = 0 \\ -3x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 3x_4 = 0 \end{array} \right. & 1.4) \left\{ \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 + 4x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 - 6x_4 = 0 \\ 7x_1 + 4x_2 + 6x_3 - 5x_4 = 0 \\ x_1 + 8x_3 + 7x_4 = 0 \end{array} \right. . \end{aligned}$$

2. Raskite tiesinę homogeninę lygčių sistemą, kurios fundamentalioji sprendinių sistema yra:

$$2.1) \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 13 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_5 = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -8 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

$$2.2.) \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -8 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}. \quad 2.3) \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 15 \\ -34 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$2.4) \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 17 \\ -37 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$2.5) \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

3. Raskite poerdvį  $U = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3]$  ir  $W = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3]$  sumos ir sankirtos dimensijas ir bazes, kai:

$$3.1) \quad \begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= (1, -1, 0, 2), & \mathbf{w}_1 &= (2, 8, 2, 4), \\ \mathbf{u}_2 &= (2, 3, 1, 4), & \mathbf{w}_2 &= (5, 5, 2, 10), \\ \mathbf{u}_3 &= (0, 5, 1, 0), & \mathbf{w}_3 &= (3, -3, 0, 6). \end{aligned}$$

$$3.2) \quad \begin{aligned} \mathbf{u}_1 &= (2, 1, 3, 1), & \mathbf{w}_1 &= (1, -1, 2, 1), \\ \mathbf{u}_2 &= (-1, 2, -4, 2), & \mathbf{w}_2 &= (2, 0, 1, -3), \\ \mathbf{u}_3 &= (2, 3, -1, 0), & \mathbf{w}_3 &= (-1, 0, 2, -2). \end{aligned}$$