

## X skyrius. EUKLIDO IR UNITARIOSIOS ERDVĖS

### 1. Euklido erdvės

**1. 1.** Sakykime, kad  $V$  – tiesinė erdvė virš realiųjų skaičių kūno  $\mathbb{R}$ .

**Apibrėžimas.** Atvaizdis  $F : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  yra vadinamas simetrine dvitiesine forma, apibrėžta tiesinėje erdvėje  $V$ , jei bet kuriems  $x, x_1, x_2, y \in V$ ,  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ ,

1.  $F(x, y) = F(y, x)$ ;
2.  $F(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 F(x_1, y) + \alpha_2 F(x_2, y)$ .

Kaip matome, simetrinė dvitiesinė forma  $F$ , apibrėžta tiesinėje erdvėje  $V$ , esant fiksuo tam antrajam argumentui, yra tiesinė pagal pirmajį argumentą. Įrodysime, kad  $F$ , esant fiksuo tam pirmajam argumentui, yra tiesinė ir pagal antrajį argumentą. Tai pateisins simetrinės formos  $F$  apibūdinimą kaip dvitiesinės.

**Teiginys.** Jei  $F : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  yra simetrinė dvitiesinė forma, tai  $F$ , esant fiksuo tam pirmajam argumentui, yra tiesinė pagal antrajį argumentą, t. y. bet kuriems  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ ,  $x, y_1, y_2 \in V$ ,

$$F(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \alpha_1 F(x, y_1) + \alpha_2 F(x, y_2).$$

**Įrodymas.**  $F(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = F(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2, x) = \alpha_1 F(y_1, x) + \alpha_2 F(y_2, x) = \alpha_1 F(x, y_1) + \alpha_2 F(x, y_2)$ .  $\triangle$

**Apibrėžimas.** Simetrinė dvitiesinė forma  $F$ , apibrėžta tiesinėje erdvėje  $V$ , yra vadinama teigiamai apibrėžta, jei kiekvienam  $x \in V$ ,  $F(x, x) \geq 0$  ir  $F(x, x) = 0$  tada ir tik tada, kai  $x = O$ .

**Apibrėžimas.** Simetrinė dvitiesinė teigiamai apibrėžta forma  $F$ , apibrėžta tiesinėje erdvėje  $V$ , yra vadinama skaliarine daugyba.

**Pastaba.** Skaliarinę daugybą  $F$ , apibrėžtą tiesinėje erdvėje  $V$ , paprastumo dėlei vadinime skaliarine daugyba tiesinėje erdvėje  $V$ , o reikšmę  $F(x, y)$ ,  $x, y \in V$ , – vektorių  $x$  ir  $y$  skaliarine sandauga.

**1. 2. Apibrėžimas.** Jei tiesinėje erdvėje  $V$  yra apibrėžta skaliarinė daugyba  $F$ , tai tiesinė erdvė  $V$  skaliarinės daugybos  $F$  atžvilgiu yra vadinama Euklido erdvė ir yra žymima  $(V, F)$ .

**Pastaba.** Dažniausiai skaliarinė daugyba Euklido (ar tiesinėje) erdvėje  $V$  yra žymima  $\langle , \rangle$ . Mes skaliarinę daugybą Euklido erdvėje  $V$  žymėsime tiek raide  $F$  ar dar kuria nors kita raide, tiek ir simboliu  $\langle , \rangle$ .

**Teiginys.** Jei  $(V, F)$  yra Euklido erdvė, tai kiekvienas tiesinės erdvės  $V$  tiesinis poerdvis  $L$  yra Euklido erdvė indukuotos skaliarinės daugybos  $F|_L$  atžvilgiu.

**Įrodymas.** Įrodymas akivaizdus.

### Pavyzdžiai.

1. Sakykime, tiesinė erdvė  $V = \mathbb{R}^n$ . Apibrėžkime atvaizdį  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  taip:

$$\langle (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j,$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Nesunkiai galite įsitikinti, kad  $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  yra Euklido erdvė. Šią Euklido erdvę vadinsime standartine  $n$ -mate Euklido erdvę.

2. Sakykime, kad  $V = \mathbb{R}[t]$  visų polinomų su realaisiais koeficientais tiesinė erdvė. Skaliarinę daugybą tiesinėje erdvėje  $\mathbb{R}[t]$  apibrėžkime taip:

$$\langle f(t), g(t) \rangle =: \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt, \quad f(t), g(t) \in \mathbb{R}[t].$$

Įsitikinkite, kad taip apibrėžtas atvaizdis  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}[t] \times \mathbb{R}[t] \rightarrow \mathbb{R}$  yra skaliarinė daugyba tiesinėje erdvėje  $\mathbb{R}[t]$ .

Euklido erdvė  $(\mathbb{R}[t], \langle \cdot, \cdot \rangle)$  yra begalinmatė.

Kiekvienam sveikajam skaičiui  $n > 0$  Euklido erdvės  $\mathbb{R}[t]$  tiesiniai poerdviai

$$\mathbb{R}[t]_n = \{f(t) \in \mathbb{R}[t] \mid \deg f(t) \leq n\} = \{a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n \mid a_j \in \mathbb{R}, 0 \leq j \leq n\}$$

yra baigtinės dimensijos Euklido erdvės.

3. Tegu  $V = \mathbb{R}[t]$ . Skaliarinę daugybą tiesinėje erdvėje  $\mathbb{R}[t]$  apibrėžkime taip:

$$\langle f(t), g(t) \rangle =: \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t)e^{-t^2} dt, \quad f(t), g(t) \in \mathbb{R}[t].$$

Įsitikinkite, kad taip apibrėžtas atvaizdis  $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}[t] \times \mathbb{R}[t] \rightarrow \mathbb{R}$  yra skaliarinė daugyba tiesinėje erdvėje  $\mathbb{R}[t]$ .

Euklido erdvė  $(\mathbb{R}[t], \langle \cdot, \cdot \rangle)$  yra begalinmatė. Panašiai, kaip ir antrajame pavyzdyste, kiekvienam sveikajam skaičiui  $n > 0$  šios Euklido erdvės  $\mathbb{R}[t]$  tiesiniai poerdviai

$$\mathbb{R}[t]_n = \{f(t) \in \mathbb{R}[t] \mid \deg f(t) \leq n\} = \{a_0 + a_1 t + \dots + a_n t^n \mid a_j \in \mathbb{R}, 0 \leq j \leq n\}$$

yra baigtinės dimensijos Euklido erdvės.

4. Sakykime, kad  $V = C[0, 1]$  – visų tolydžių intervalo  $[0, 1]$  funkcijų su reikšmėmis realiųjų skaičių aibėje  $\mathbb{R}$  tiesinė erdvė. Apibrėžkime skaliarinę daugybą tiesinėje erdvėje  $C[0, 1]$  taip:

$$\langle f(t), g(t) \rangle =: \int_0^1 f(t)g(t)dt, \quad f(t), g(t) \in C[0, 1].$$

Įsitikinkite, kad taip apibrėžtas atvaizdis  $\langle \cdot, \cdot \rangle : C[0, 1] \times C[0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  yra skaliarinė daugyba tiesinėje erdvėje  $C[0, 1]$ .

Euklido erdvė  $(C[0, 1], \langle \cdot, \cdot \rangle)$  yra begalinmatė.

5. Sakykime, kad  $V = M_n(\mathbb{R})$  – visų  $n$ -tos eilės kvadratinė matricų su koeficientais realiujų skaičių kūne  $\mathbb{R}$  tiesinė erdvė. Skaliarinę daugybą tiesinėje erdvėje  $M_n(\mathbb{R})$  apibrėžkime taip:

$$\langle A, B \rangle = \text{Tr}(AB^t), \quad A, B \in M_n(\mathbb{R}).$$

$B^t$  – tai transponuota matrica  $B$ .

Įsitikinkite, kad taip apibrėžtas atvaizdis  $\langle \cdot, \cdot \rangle : M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  yra skaliarinė daugyba tiesinėje erdvėje  $M_n(\mathbb{R})$ .

**1. 3. Teiginys.** Kiekvienoje baigtinės dimensijos tiesinėje erdvėje  $V$  virš realiujų skaičių kūno  $\mathbb{R}$  galima apibrėžti skaliarinę daugybą.

**Įrodymas.** Sakykime, kad  $V$  – baigtinės dimensijos tiesinė erdvė virš realiujų skaičių kūno  $\mathbb{R}$ ,  $u_1, u_2, \dots, u_n$  – šios erdvės bazė. Tiesinės erdvės  $V$  vektorius  $v_1$  ir  $v_2$ , užrašę bazės  $u_1, u_2, \dots, u_n$  vektoriais atitinkamai  $v_1 = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n$  ir  $v_2 = \beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_n u_n$ , vektorių  $v_1$  ir  $v_2$  skaliarinę sandaugą apibrėžkime taip:

$$\langle v_1, v_2 \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j.$$

Įsitikinsime, kad taip apibrėžtas atvaizdis  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  yra skaliarinė daugyba tiesinėje erdvėje  $V$ .

Visiškai akivaizdu, kad bet kuriems vektoriams  $v_1, v_2 \in V$ ,  $\langle v_1, v_2 \rangle = \langle v_2, v_1 \rangle$ . Lieka įsitikinti, kad atvaizdis  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  yra tiesinis pagal pirmajį argumentą ir teigiamai apibrėžtas.

Sakykime,  $v_1 = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n$ ,  $v_2 = \beta_1 u_1 + \beta_2 u_2 + \dots + \beta_n u_n$ ,  $v_3 = \gamma_1 u_1 + \gamma_2 u_2 + \dots + \gamma_n u_n$ ,  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ . Tuomet

$$\langle \lambda v_1 + \mu v_2, v_3 \rangle = \left\langle \lambda \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j + \mu \sum_{j=1}^n \beta_j u_j, \sum_{j=1}^n \gamma_j u_j \right\rangle =$$

$$\left\langle \sum_{j=1}^n (\lambda \alpha_j + \mu \beta_j) u_j, \sum_{j=1}^n \gamma_j u_j \right\rangle = \sum_{j=1}^n (\lambda \alpha_j + \mu \beta_j) \gamma_j =$$

$$\sum_{j=1}^n \lambda \alpha_j \gamma_j + \sum_{j=1}^n \mu \beta_j \gamma_j = \lambda \sum_{j=1}^n \alpha_j \gamma_j + \mu \sum_{j=1}^n \beta_j \gamma_j = \lambda \langle v_1, v_3 \rangle + \mu \langle v_2, v_3 \rangle.$$

Akivaizdu, kad  $\langle v_1, v_1 \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j, \sum_{j=1}^n \alpha_j u_j \right\rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j^2 \geq 0$  ir  $\langle v_1, v_1 \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j^2 = 0$  tada ir tik tada, kai  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$ , t. y.  $\langle v_1, v_1 \rangle = 0$  tada ir tik tada, kai  $v = O$ .  $\triangle$

Įrodysime paprastą išvadą, gaunamą remiantis skaliarinės daugybos tiesinėje erdvėje apibrėžimu.

**Teiginys.** Sakykime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė,  $O$  – tiesinės erdvės  $V$  nulinis vektorius. Tuomet kiekvienam  $u \in V$ ,  $F(O, u) = 0$ .

**Įrodymas.** Iš lygybės  $F(O, u) = F(O+O, u) = F(O, u) + F(O, u) = 2F(O, u)$  gauname  $F(O, u) = 0$ .

**1. 4. Koši-Švarco-Buniakovskio nelygybė.** Sakykime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė. Tuomet bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $F(u, v)^2 \leq F(u, u)F(v, v)$  ir  $F(u, v)^2 = F(u, u)F(v, v)$  tada ir tik tada, kai vektoriai  $u$  ir  $v$  yra tiesiškai priklausomi.

**Įrodymas.** Nagrinėkime vektoriaus  $tu+v$  ( $t$  – kintamasis, vietoje kurio galima išrašyti reikšmes  $\alpha \in \mathbb{R}$ ) skaliarinį kvadratą  $F(tu+v, tu+v)$ . Kadangi skaliarinė daugyba  $F : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  yra dvitiesinė ir simetrinė funkcija, tai

$$F(tu+v, tu+v) = t^2F(u, u) + 2tF(u, v) + F(v, v) \geq 0.$$

$F(u, u) = 0$ , tada ir tik tada, kai  $u = O$ . Šiuo atveju vektoriai  $u = O$  ir  $v$  yra tiesiškai priklausomi ir teisinga lygybė  $F(O, v)^2 = F(O, O)F(v, v)$ , nes  $F(O, v) = 0$ .

Dabar nagrinėkime atvejį, kai  $F(u, u) \neq 0$ . Šiuo atveju  $F(u, u) > 0$  ir kiekvienam  $t \in \mathbb{R}$ ,  $t^2F(u, u) + 2tF(u, v) + F(v, v) \geq 0$ , t. y., kvadratinis trinaris  $t^2F(u, u) + 2tF(u, v) + F(v, v)$  yra neneigiamai apibrėžtas. Vadinas, šio kvadratinio trinario diskriminantas tenkina nelygybę:  $F(u, v)^2 - F(u, u)F(v, v) \leq 0$ , t. y.  $F(u, v)^2 \leq F(u, u)F(v, v)$ .

Neneigiamai apibrėžtas kvadratinis trinaris  $t^2F(u, u) + 2tF(u, v) + F(v, v)$  turi realią šaknį tada ir tik tada, kai jo diskriminantas yra lygus nuliui, t. y.  $F(u, v)^2 = F(u, u)F(v, v)$ . Taigi  $F(u, v)^2 = F(u, u)F(v, v)$  tada ir tik tada, kai egzistuoja tokis  $t_0 \in \mathbb{R}$ , kad  $t_0^2F(u, u) + 2t_0F(u, v) + F(v, v) = F(t_0u+v, t_0u+v) = 0$ , t. y., kai  $t_0u+v = O$  arba, kitaip tariant, vektoriai  $u$  ir  $v$  yra tiesiškai priklausomi.  $\triangle$

**Pastaba.** Koši-Švarco-Buniakovskio nelygybė teisinga tiek baigtinės dimensijos, tiek begalinės dimensijos Euklido erdvės atvejais. Įrodydami šią nelygybę, nesirémėme Euklido erdvės dimensiją.

### Pavyzdžiai.

1. Sakykime, kad  $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  standartinė  $n$ -matė Euklido erdvė. Priminsime, kad skaliarinė daugyba šioje erdvėje apibrėžta taip:

$$\langle (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j,$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Tuomet, remdamiesi Koši-Švarco-Buniakovskio nelygybe, galime parašyti:

$$\left( \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j \right)^2 \leq \sum_{j=1}^n \alpha_j^2 \sum_{j=1}^n \beta_j^2.$$

2. Tegu  $V = \mathbb{R}[t]$  visų polinomų su realaisiais koeficientais tiesinė erdvė, o skaliarinė daugyba šioje erdvėje apibrėžta taip:

$$\langle f(t), g(t) \rangle := \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt, \quad f(t), g(t) \in \mathbb{R}[t].$$

Tuomet, remdamiesi Koši-Švarco-Buniakovskio nelygybe, galime parašyti:

$$\left( \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt \right)^2 \leq \int_{-1}^1 f(t)^2 dt \int_{-1}^1 g(t)^2 dt$$

3. Tegu  $V = \mathbb{R}[t]$ , o skaliarinė daugyba šioje erdvėje apibrėžta taip:

$$\langle f(t), g(t) \rangle := \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t)e^{-t^2} dt, \quad f(t), g(t) \in \mathbb{R}[t].$$

Tuomet, remdamiesi Koši-Švarco-Buniakovskio nelygybe, galime parašyti:

$$\left( \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t)e^{-t^2} dt \right)^2 \leq \int_{-\infty}^{\infty} f(t)^2 e^{-t^2} dt \int_{-\infty}^{\infty} g(t)^2 e^{-t^2} dt.$$

## 2. Euklido erdvės metrinės savybės

**2. 1.** Prieš pradėdami aptarti Euklido erdvės metrines savybes, pirmiausia apibrėšime normuotos ir metrinės erdviių sąvokas.

**Apibrėžimas.** Sakykime,  $V$  tiesinė erdvė virš realiųjų skaičių kūno  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{R}_+$  – neneigiamų realiųjų skaičių aibė. Funkcija  $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_+$  yra vadinama norma, apibrėžta tiesinėje erdvėje  $V$ , jei bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,

1.  $\|u\| \geq 0$ ,  $\|u\| = 0$  tada ir tik tada, kai  $u = O$ ;
2.  $\|\alpha u\| = |\alpha| \cdot \|u\|$ ;
3.  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$  (trikampio nelygybė).

**Apibrėžimas.** Tiesinė erdvė  $V$  virš realiųjų skaičių kūno  $\mathbb{R}$ , kurioje apibrėžta norma  $\|\cdot\|$ , yra vadinama normos  $\|\cdot\|$  atžvilgiu normuota tiesine erdvė ir yra žymima  $(V, \|\cdot\|)$ . Funkcijos  $\|\cdot\|$  reikšmė  $\|v\|$  vektoriuje  $v$  yra vadinama vektoriaus  $v$  norma arba vektoriaus  $v$  ilgiu.

**Apibrėžimas.** Sakykime,  $X$  – netuščia aibė. Funkcija  $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$  yra vadinama atstumo funkcija, apibrėžta aibėje  $X$ , jei bet kuriems  $a, b, c \in X$ ,

1.  $\rho(a, b) \geq 0$ ,  $\rho(a, b) = 0$  tada ir tik tada, kai  $a = b$ ;
2.  $\rho(a, b) = \rho(b, a)$ ;

3.  $\rho(a, b) \leq \rho(a, c) + \rho(c, b)$  (trikampio nelygybė).

**Apibrėžimas.** Netuščia aibė  $X$ , kurioje apibrėžta atstumo funkcija  $\rho$ , yra vadinama metrine erdve  $\rho$  atvilgiu ir yra žymima  $(X, \rho)$ .

**2. 2** Normuotoje tiesinėje erdvėje  $(V, || ||)$  galima apibrėžti atstumo funkciją  $\rho : V \times V \rightarrow \mathbb{R}_+$  taip: bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $\rho(u, v) =: ||u - v||$ . Galite išitikinti, kad taip apibrėžta funkcija  $\rho : V \times V \rightarrow \mathbb{R}_+$  iš tikrujų yra atstumo funkcija. Be to, ši atstumo funkcija yra suderinta su tiesinės erdvės  $V$  struktūra: bet kuriems  $u, v, w \in V$ ,  $\rho(u + w, v + w) = \rho(u, v)$ .

Jei tiesinė erdvė  $(V, || ||)$  yra normuota, tai galima kalbėti apie šios erdvės vektorių ilgius, atstumus tarp vektorių, vektorių sekų ribas ir t. t.. Normuotos tiesinės erdvės atveju kamai tarp vektorių nėra apibrėžti, negalime kalbėti apie įvairių figūrų plotus, tūrius. Metrinėse erdvėse galima nagrinėti atstumus tarp erdvės elementų, metrinės erdvės elementų sekų ribas, bet negalime nagrinėti šios erdvės elementų ilgius. Normuotų tiesinių erdviių klasė yra siauresnė nei metrinių tiesinių erdviių klasė. Žymiai siauresnė erdviių klasė nei normuotos tiesinės erdvės sudaro Euklido erdvės. Euklido erdviių atveju, kaip išitikinsime, galima nagrinėti vektorių ilgius, kampus tarp vektorių, įvairių dimensijų gretasienių "tūrius" ir t. t..

Dabar apibrėšime normos funkciją Euklido erdvėje.

Sakykime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė. Apibrėžkime funkciją  $|| || : V \rightarrow \mathbb{R}_+$ ,  $||u|| =: \sqrt{F(u, u)}$ ,  $u \in V$ . Išitikinsime, kad taip apibrėžta funkcija  $|| ||$  turi sekančias savybes:

1. Kiekvienam  $u \in V$ ,  $||u|| \geq 0$  ir  $||u|| = 0$  tada ir tik tada, kai  $u = O$ ;
2. Kiekvienam  $u \in V$ , kiekvienam  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $||\alpha u|| = |\alpha| \cdot ||u||$ ;
3. Bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $||u + v|| \leq ||u|| + ||v||$  (trikampio nelygybė).

Akivaizdu, kad funkcija  $|| ||$  tenkina pirmąją normos apibrėžimo sąlygą. Jei  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $u \in V$ , tai  $||\alpha u|| = \sqrt{F(\alpha u, \alpha u)} = \sqrt{\alpha^2 F(u, u)} = |\alpha| \sqrt{F(u, u)} = |\alpha| \cdot ||u||$ . Lieka irodyti, kad funkcija  $|| ||$  tenkina trečiąją normos apibrėžimo sąlygą.

Sakykime,  $u, v \in V$ . Tuomet

$$||u + v||^2 = F(u + v, u + v) =$$

$$F(u, u) + 2F(u, v) + F(v, v) \leq ||u||^2 + 2||u|| \cdot ||v|| + ||v||^2 = (||u|| + ||v||)^2$$

(remiantis Koši-Švarco-Buniakovskio nelygybe,  $F(u, v)^2 \leq F(u, u)F(v, v)$  arba  $|F(u, v)| \leq ||u|| \cdot ||v||$ , nes  $||u||^2 = F(u, u)$ ,  $||v||^2 = F(v, v)$ ). Nelygybė  $||u + v||^2 \leq ||u||^2 + 2||u|| \cdot ||v|| + ||v||^2$  ekvivalenti nelygybei  $||u + v|| \leq ||u|| + ||v||$ , nes dydžiai  $||u + v||$ ,  $||u|| + ||v||$  yra neneigiami.

**2. 3.** Kaip matome, Euklido erdvė  $(V, F)$  priklauso normuotų erdviių ir tuo labiau metrinių erdviių klasei. Kyla klausimas, kokias sąlygas turi tenkinti normuotos erdvės  $(V, || ||)$  normos funkcija  $|| ||$ , kad normuotoje erdvėje  $(V, || ||)$  būtų galima apibrėžti skaliarinę daugybą  $F$ , suderintą su normos funkcija  $|| ||$  tokia prasme: kiekvienam  $u \in V$ ,  $F(u, u) = ||u||^2$ ? Prieš atsakydami į šį klausimą, irodysime svarbią skaliarinės daugybos savybę.

**Teiginys.** Sakykime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė. Tuomet bet kuriems vektoriams  $u, v \in V$ , teisinga lygybė:

$$F(u + v, u + v) + F(u - v, u - v) = 2(F(u, u) + F(v, v)).$$

**Pastaba.** Šią lygybę galima interpretuoti taip: lygiagretainio istrižainių ilgių kvadratų suma yra lygi lygiagretainio kraštinių ilgių kvadratų sumai. Be to, šią lygybę galime užrašyti ir taip: bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$ .

**Įrodymas.**  $F(u + v, u + v) + F(u - v, u - v) = F(u, u) + F(u, v) + F(v, u) + F(v, v) + F(u, u) - F(u, v) - F(v, u) + F(v, v) = 2F(u, u) + 2F(v, v)$ .  $\triangle$

**Teorema.** Normuotoje tiesinėje erdvėje  $(V, \|\cdot\|)$  galima apibrėžti skaliarinę daugyba  $F$ , suderintą su normos funkcija  $\|\cdot\|$  tada ir tik tada, kai normos funkcija  $\|\cdot\|$  tenkina sąlygą: bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$ .

**Įrodymas.** Šios teoremos įrodymas pateikiamas skaitytojui kaip pratimas. Apibrėžkime atvaizdį  $F : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  taip: bet kuriems  $u, v \in V$ ,

$$F(u, v) =: \frac{1}{4}(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2).$$

Akivaizdu, kad kiekvienam  $u \in V$ ,  $F(u, u) = \|u\|^2$ . Taip pat akivaizdu, kad bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $F(u, v) = F(v, u)$ . Įrodykite, kad bet kuriems  $u, u_1, u_2, v \in V$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ , teisingos lygybės:

1.  $F(u_1 + u_2, v) = F(u_1, v) + F(u_2, v)$ ;
2.  $F(\alpha u, v) = \alpha F(u, v)$ .

Antrają lygybę pirmiausia įrodykite tuo atveju, kai  $\alpha$  yra sveikasis skaičius, o po to įrodykite, kai  $\alpha$  yra racionalusis skaičius. Kadangi normos funkcija  $\|\cdot\|$  yra tolydi, tai tolydi yra ir funkcija  $F$ . Vadinas, jei funkcija  $F$  tenkina antrają sąlygą, kai  $\alpha$  yra racionalusis skaičius, tai ji tenkina antrają sąlygą ir tuo atveju, kai  $\alpha$  yra realusis skaičius.

**Apibrėžimas.** Euklido erdvės  $(V, F)$  vektorius  $u$ , kurio ilgis lygus 1, yra vadinamas normuotu vektoriumi. Jei  $V \ni u \neq O$ , tai vektorių  $u$  galime normuoti, padauginei jį iš  $\|u\|^{-1}$ :  $\|u\|^{-1}u$  – normuotas vektorius.

**2. 4.** Sakykime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė. Kadangi bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $|F(u, v)| \leq \|u\| \cdot \|v\|$ , tai bet kuriems nenuliniam vektoriams  $u, v \in V$ ,

$$-1 \leq \frac{F(u, v)}{\|u\| \cdot \|v\|} \leq 1.$$

Apibrėžkime kampą  $\psi(u, v)$  tarp vektorių  $u$  ir  $v$ , kurio kosinusas yra lygus  $\frac{F(u, v)}{\|u\| \cdot \|v\|}$ . Taigi bet kuriems nenuliniam vektoriams  $u, v \in V$ ,

$$\cos \psi(u, v) =: \frac{F(u, v)}{\|u\| \cdot \|v\|}.$$

Kampus  $\psi(u, v)$  tarp vektorių  $u$  ir  $v$ , remiantis pastaraja lygybe, nėra vienareikšmiškai apibrėžtas. Susitarkime, kad  $\psi(u, v)$  yra lygus mažiausiai teigiamai reikšmei, tenkinančiai anksčiau užrašytą lygtį.

**Apibrėžimas.** Euklido erdvės  $(V, F)$  nenuliniai vektoriai  $u$  ir  $v$  yra vadinami ortogonaliais, jei  $F(u, v) = 0$ . Jei vektoriai  $u$  ir  $v$  yra ortogonalūs, tai yra rašoma  $u \perp v$ .

**2. 5. Lygiagretainio plotas.** Taigi Euklido erdvėje apibrėžtos vektoriaus ilgio, atstumo tarp vektorių ir kampo tarp vektorių sąvokos. Jei  $(V, F)$  yra  $n$ -matė Euklido erdvė, tai galima apibrėžti  $m$ -mačius gretasienius ir tokių figūrų tūrius. Pavyzdžiu, jei Euklido erdvės  $(V, F)$  vektoriai  $u$  ir  $v$  yra tiesiškai nepriklausomi, tai figūrą  $\{\alpha u + \beta v \mid 0 \leq \alpha, \beta \leq 1\}$  galime pavadinti dvimačiu lygiagretaininiu, užtemptu ant vektorių  $u$  ir  $v$ . Apskaičiuokime tokio lygiagretainio plotą. Kaip žinome, lygiagretainio plotas yra lygus kurios nors lygiagretainio kraštinės ir lygiagretainio aukštinės iš šią kraštinę ilgių sandaugai. Imkime lygiagretainio kraštinę  $u$ . Tuomet lygiagretainio aukštinės iš kraštinę  $u$  ilgis yra lygus  $\|v\| \sin \psi(u, v)$ . Taigi lygiagretainio plotas yra lygus  $\|u\| \cdot \|v\| \sin \psi(u, v)$ . Patogu apskaičiuoti šio lygiagretainio ploto kvadratą:

$$\begin{aligned} (\|u\| \cdot \|v\| \sin \psi(u, v))^2 &= F(u, u)F(v, v)(1 - \cos^2 \psi(u, v)) = \\ F(u, u)F(v, v)(1 - \frac{F(u, v)^2}{F(u, u)F(v, v)}) &= F(u, u)F(v, v) - F(u, v)^2. \end{aligned}$$

Štai kokia įdomi Koši-Švarco-Buniakovskio nelygybės geometrinė prasmė! Dabar akivaizdu, kad

$$F(u, u)F(v, v) - F(u, v)^2 > 0,$$

kai vektoriai  $u$  ir  $v$  yra tiesiškai nepriklausomi ir

$$F(u, u)F(v, v) - F(u, v)^2 = 0$$

tada ir tik tada, kai  $u$  ir  $v$  yra tiesiškai priklausomi. Lygiagretainis, užtemptas ant vektorių yra "supliuškės" tada ir tik tada, kai vektoriai  $u$  ir  $v$  yra tiesiškai priklausomi. "Supliuškusio" lygiagretainio plotas yra lygus 0.

**2. 6. Trimačio gretasienio tūris.** Įdomu apskaičiuoti trimačio gretasienio, užtempto ant trijų Euklido erdvės  $(V, F)$  tiesiškai nepriklausomų vektorių  $u_1, u_2, u_3$ , tūri. Išspręskime šį uždavinį. Tokio gretasienio tūris yra lygus gretasienio pagrindo ploto ir gretasienio aukštinės iš ši pagrindą ilgio sandaugai. Gretasienio pagrindo, užtempto, pavyzdžiu, ant vektorių  $u_1$  ir  $u_2$ , ploto kvadratas yra lygus  $F(u_1, u_1)F(u_2, u_2) - F(u_1, u_2)^2$ . Lieka apskaičiuoti gretasienio aukštinės iš ši pagrindą ilgi. Gretasienio aukštinė  $h$  iš ši pagrindą turi pavidalą:  $h = u_3 - \alpha_1 u_1 - \alpha_2 u_2$ ,  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ . Koeficientai  $\alpha_1$  ir  $\alpha_2$  – nežinomi. Kadangi  $h$  yra statmena (ortogonal) pagrindui, tai  $F(h, u_1) = 0$ ,  $F(h, u_2) = 0$ . Iš šias lygtis išrašę  $h$  išraišką, gauname lygčių sistemą:

$$\begin{cases} F(u_3 - \alpha_1 u_1 - \alpha_2 u_2, u_1) = 0 \\ F(u_3 - \alpha_1 u_1 - \alpha_2 u_2, u_2) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Pertvarkę šią lygčių sistemą, gauname:

$$\begin{cases} \alpha_1 F(u_1, u_1) + \alpha_2 F(u_2, u_1) = F(u_3, u_1) \\ \alpha_1 F(u_1, u_2) + \alpha_2 F(u_2, u_2) = F(u_3, u_2) \end{cases}$$

Šios lygčių sistemos determinantas

$$\det \begin{pmatrix} F(u_1, u_1) & F(u_2, u_1) \\ F(u_1, u_2) & F(u_2, u_2) \end{pmatrix} = F(u_1, u_1)F(u_2, u_2) - F(u_1, u_2)^2 > 0,$$

kaip matome, yra nelygus nuliui. Vadinasi, šią lygčių sistemą galime išspresti remdamiesi Kramerio taisykle:

$$\alpha_1 = \frac{\begin{vmatrix} F(u_3, u_1) & F(u_2, u_1) \\ F(u_3, u_2) & F(u_2, u_2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F(u_1, u_1) & F(u_2, u_1) \\ F(u_1, u_2) & F(u_2, u_2) \end{vmatrix}}, \quad \alpha_2 = \frac{\begin{vmatrix} F(u_1, u_1) & F(u_3, u_1) \\ F(u_1, u_2) & F(u_3, u_2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F(u_1, u_1) & F(u_2, u_1) \\ F(u_1, u_2) & F(u_2, u_2) \end{vmatrix}},$$

arba

$$\alpha_1 = \frac{F(u_3, u_1)F(u_2, u_2) - F(u_3, u_2)F(u_2, u_1)}{F(u_1, u_1)F(u_2, u_2) - F(u_1, u_2)^2},$$

$$\alpha_2 = \frac{F(u_1, u_1)F(u_3, u_2) - F(u_1, u_2)F(u_3, u_1)}{F(u_1, u_1)F(u_2, u_2) - F(u_1, u_2)^2}.$$

Dabar galime apskaičiuoti aukštinės  $h$  ilgio kvadrata:

$$\begin{aligned} \|h\|^2 &= F(u_3 - \alpha_1 u_1 - \alpha_2 u_2, u_3 - \alpha_1 u_1 - \alpha_2 u_2) = \\ &= F(u_3, u_3) - \alpha_1 F(u_1, u_3) - \alpha_2 F(u_2, u_3). \end{aligned}$$

Taip užrašydamis aukštinės  $h$  ilgio kvadratą pasinaudojome tuo, kad  $(\alpha_1, \alpha_2)$  yra (1)-os lygčių sistemos sprendinys. Irašę  $\alpha_1, \alpha_2$  reikšmes į aukštinės  $h$  ilgio kvadrato išraišką, gauname:

$$F(u_3, u_3) - \frac{\begin{vmatrix} F(u_3, u_1) & F(u_2, u_1) \\ F(u_3, u_2) & F(u_2, u_2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F(u_1, u_1) & F(u_2, u_1) \\ F(u_1, u_2) & F(u_2, u_2) \end{vmatrix}} F(u_1, u_3) - \frac{\begin{vmatrix} F(u_1, u_1) & F(u_3, u_1) \\ F(u_1, u_2) & F(u_3, u_2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F(u_1, u_1) & F(u_2, u_1) \\ F(u_1, u_2) & F(u_2, u_2) \end{vmatrix}} F(u_2, u_3)$$

Subendravardiklinę šį reiškinį ir padauginę iš pagrindo ploto kvadrato, gauname gretasienio, užtempo ant vektorių  $u_1, u_2, u_3$ , tūrio kvadrato išraišką:

$$\det \begin{pmatrix} F(u_1, u_1) & F(u_1, u_2) & F(u_1, u_3) \\ F(u_2, u_1) & F(u_2, u_2) & F(u_2, u_3) \\ F(u_3, u_1) & F(u_3, u_2) & F(u_3, u_3) \end{pmatrix}.$$

**2. 7.** Panašiai būtų galima pabandyti apskaičiuoti  $r$ -mačių gretasienių, užtemptų ant Euklido erdvės  $(V, F)$  tiesiškai nepriklausomų vektorių  $u_1, u_2, \dots, u_r \in V$ ,  $r$ -mačių tūrių kvadratus. Tiesiogiai tai padaryti gana sudėtinga. Bet galima tai ir visiškai kitaip padaryti. Pavyzdžiu, jei Euklido erdvės  $(V, F)$  vektoriai  $u_1, u_2, u_3$  yra tarpusavy ortogonalūs, tai stačiakampio gretasienio, užtempo ant vektorių  $u_1, u_2, u_3$ , tūrio kvadratas yra lygus

$$\|u_1\|^2 \|u_2\|^2 \|u_3\|^3 = F(u_1, u_1)F(u_2, u_2)F(u_3, u_3).$$

Savaime suprantama, kad  $r$ -mačio stačiakampio gretasienio, užtempo ant tarpusavy ortogonalinių vektorių  $u_1, u_2, \dots, u_r \in V$ ,  $r$ -mačio tūrio kvadratas turėtų būti apibrėžiamas taip:

$$\|u_1\|^2 \|u_2\|^2 \dots \|u_r\|^2 = F(u_1, u_1)F(u_2, u_2) \dots F(u_r, u_r).$$

Jei Euklido erdvės  $(V, F)$  vektoriai  $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$  nėra tarpusavyje ortogonalūs, tai egzistuoja ortogonalizacijos algoritmas, kuriuo remiantis vektorių šeimą  $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$  galima pertvarkyti į tokią tarpusavyje ortogonalų vektorių šeimą  $u_1, u_2, \dots, u_r \in V$ , kad  $r$ -mačių gretasienių, užtemptų tiek ant vektorių  $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$ , tiek ant vektorių  $u_1, u_2, \dots, u_r \in V$ , tūriai yra lygūs.

### 3. Ortogonalizacijos algoritmas. Ortonormuotos vektorių šeimos

**3. 1. Apibrėžimas.** Euklido erdvės  $(V, F)$  vektorių šeima  $u_1, u_2, \dots, u_r$  yra vadina ma ortonormuota, jei  $F(u_i, u_j) = \delta_{ij}$ ,  $1 \leq i, j \leq r$  ( $\delta_{ij}$  – Kronekerio simbolis).

**Teiginys.** Euklido erdvės  $(V, F)$  ortonormuota vektorių šeima  $u_1, u_2, \dots, u_r$  yra tiesiskai nepriklausoma.

**Įrodymas.** Sakyime, kad  $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_r u_r = O$ . Skaliariškai padauginę šios lygybės abi puses iš vektoriaus  $u_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , gauname:

$$F(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_r u_r, u_j) = \alpha_j = 0, \quad 1 \leq j \leq r.$$

Taigi vektoriai  $u_1, u_2, \dots, u_r$  yra tiesiskai nepriklausomi.  $\triangle$

**3. 2. Teorema (Ortogonalizacijos algoritmas (procesas)).** Sakyime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė. Egzistuoja algoritmas, vadinas ortogonalizacijos algoritmu (procesu), kuriuo remiantis Euklido erdvės  $V$  kiekvieną tiesiskai nepriklausomą vektorių šeimą  $v_1, v_2, \dots, v_s$  galima pertvarkyti į tokią ortonormuotą vektorių šeimą  $u_1, u_2, \dots, u_s$ , kad kiekvienam  $j$ ,  $1 \leq j \leq s$ ,

$$\mathbb{R}v_1 + \mathbb{R}v_2 + \dots + \mathbb{R}v_j = \mathbb{R}u_1 + \mathbb{R}u_2 + \dots + \mathbb{R}u_j.$$

**Pastaba.**  $\mathbb{R}v_1 + \mathbb{R}v_2 + \dots + \mathbb{R}v_j$  – vektorių  $v_1, v_2, \dots, v_j$  tiesinis apvalkalas. Kadangi vektoriai  $v_1, v_2, \dots, v_s$  yra tiesiskai nepriklausomi, tai kiekvienam  $r$ ,  $1 \leq r \leq s$ , poerdvių  $\mathbb{R}v_j$ ,  $1 \leq j \leq s$ , suma  $\mathbb{R}v_1 + \mathbb{R}v_2 + \dots + \mathbb{R}v_r$  yra tiesioginė suma  $\mathbb{R}v_1 \oplus \mathbb{R}v_2 \oplus \dots \oplus \mathbb{R}v_r$ .

**Įrodymas.** Šią teoremą įrodysime matematinės indukcijos metodu.

Pirmiausia įrodysime, kad tiesiskai nepriklausomus vektorius  $v_1, v_2, \dots, v_s$  galima pertvarkyti į tokią tarpusavyje ortogonalų vektorių šeimą  $w_1, w_2, \dots, w_s$ , kad kiekvienam  $j$ ,  $1 \leq j \leq s$ ,

$$\mathbb{R}v_1 + \mathbb{R}v_2 + \dots + \mathbb{R}v_j = \mathbb{R}w_1 + \mathbb{R}w_2 + \dots + \mathbb{R}w_j.$$

Po to vektorius  $w_1, w_2, \dots, w_s$  normuosime ir gausime ortonormuotą vektorių šeimą  $u_j = \|w_j\|^{-1}w_j$ , tenkinančią sąlygas, suformuluotas teoremoje.

Tegu  $w_1 = v_1$ . Sakyime,  $w_2 = \alpha_{11}w_1 + v_2$ . Koeficientas  $\alpha_{11}$  yra kol kas nežinomas. Kiekvienam  $\alpha_{11} \in \mathbb{R}$ ,  $w_2 \neq O$ . Koeficientą  $\alpha_{11}$  parinkime taip, kad  $w_2$  būtų ortogonalus vektoriui  $w_1$ . Tuo tikslu sudarome lygtį:

$$F(\alpha_{11}w_1 + v_2, w_1) = 0.$$

Kaip matome, lygtis  $\alpha_{11}F(w_1, w_1) + F(v_2, w_1) = 0$  yra išsprendžiama, nes, kadangi  $w_1 \neq O$ , tai ir  $F(w_1, w_1) \neq 0$ . Be to, akivaizdu, kad  $\mathbb{R}v_1 = \mathbb{R}w_1$ ,  $\mathbb{R}v_1 + \mathbb{R}v_2 = \mathbb{R}w_1 + \mathbb{R}w_2$ .

Sakykime, kad jau radome tokius tarpusavy ortogonalius vektorius  $w_1, w_2, \dots, w_r$ , kad kiekvienam  $j$ ,  $1 \leq j \leq r$ ,

$$\mathbb{R}v_1 + \mathbb{R}v_2 + \dots + \mathbb{R}v_j = \mathbb{R}w_1 + \mathbb{R}w_2 + \dots + \mathbb{R}w_j.$$

Jei  $r = s$ , tai teoremos įrodymas baigtas. Jei  $r < s$ , tai, sakykime,  $w_{r+1} = \alpha_{r1}w_1 + \alpha_{r2}w_2 + \dots + \alpha_{rr}w_r + v_{r+1}$ . Pastebėsime, kad bet kuriems  $\alpha_{r1}, \alpha_{r2}, \dots, \alpha_{rr} \in \mathbb{R}$ ,  $w_{r+1} \neq O$ . Koeficientus  $\alpha_{r1}, \alpha_{r2}, \dots, \alpha_{rr}$  parinksime taip, kad būtų  $w_{r+1} \perp w_1, w_{r+1} \perp w_2, \dots, w_{r+1} \perp w_r$ . Tuo tikslu sudarome lygčių sistemą:

$$\left\{ \begin{array}{l} F(\alpha_{r1}w_1 + \alpha_{r2}w_2 + \dots + \alpha_{rr}w_r + v_{r+1}, w_1) = 0 \\ F(\alpha_{r1}w_1 + \alpha_{r2}w_2 + \dots + \alpha_{rr}w_r + v_{r+1}, w_2) = 0 \\ \dots \dots \dots \dots \\ F(\alpha_{r1}w_1 + \alpha_{r2}w_2 + \dots + \alpha_{rr}w_r + v_{r+1}, w_r) = 0 \end{array} \right.$$

Kadangi vektoriai  $w_1, w_2, \dots, w_r$  yra tarp savęs ortogonalūs, tai kairėje lygčių sistemos pusėje skaliariškai sudauginę vektorius, gaunme:

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \alpha_{r1}F(w_1, w_1) + F(v_{r+1}, w_1) & = 0 \\ \alpha_{r2}F(w_2, w_2) + F(v_{r+1}, w_2) & = 0 \\ \dots & & \dots \\ \alpha_{rr}F(w_r, w_r) + F(v_{r+1}, w_r) & = 0 \end{array} \right.$$

Kai matome, ši lygčių sistema yra išsprendžiamą. Taigi vektorius  $w_{r+1} = \sum_{j=1}^r \alpha_{rj} w_j + v_{r+1}$ , ortogonalus vektoriams  $w_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , egzistuoja. Kadangi  $\bigoplus_{j=1}^r \mathbb{R}v_j = \bigoplus_{j=1}^r \mathbb{R}w_j$ , tai akivaizdu, kad  $w_{r+1} \in \bigoplus_{j=1}^{r+1} \mathbb{R}v_j$  ir  $v_{r+1} \in \bigoplus_{j=1}^{r+1} \mathbb{R}w_j$ . Vadinas,  $\bigoplus_{j=1}^{r+1} \mathbb{R}v_j = \bigoplus_{j=1}^{r+1} \mathbb{R}w_j$ .

Taigi nurodėme, kaip duotus tiesiškai nepriklausomus vektorius  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq s$ , galima pertvarkyti į tarpusavy ortogonalinių vektorių šeimą  $w_j$ ,  $1 \leq j \leq s$ , tenkinančią sąlygas: kiekviename  $r$ ,  $1 \leq r \leq s$ ,

$$\bigoplus_{j=1}^r \mathbb{R}v_j = \bigoplus_{j=1}^r \mathbb{R}w_j.$$

Normavę vektorius  $w_j$ ,  $1 \leq j \leq s$ , gausime ieškomą ortonormuotą vektorių šeimą  $u_j = \|w_j\|^{-1}w_j$ ,  $1 \leq j \leq s$ .  $\triangle$

**3. 3. Išvada.** Kiekvienoje Euklido erdvėje egzistuoja ortonormuota bazė.

**Įrodymas.** Kurią nors Euklido erdvės bazę ortogonalizacijos algoritmu galime pertvarkyti į šios erdvės ortonormuotą bazę.  $\triangle$

Pratimas.

Sakykime,  $v_1, v_2, \dots, v_s$  – tieisiškai nepriklausomi, o  $v_1, v_2, \dots, v_s, v_{s+1}$  – tiesiškai priklausomi Euklido erdvės  $(V, F)$  vektoriai. Išrodykite, kad ortogonalizavę vektorius  $v_1, v_2,$

$\dots, v_s, v_{s+1}$ , gausite tokią ortogonaliaj vektorių šeimą  $w_1, w_2, \dots, w_s, w_{s+1}$ , kurios vektoriai  $w_j \neq O$ ,  $1 \leq j \leq s$ , o  $w_{s+1} = O$ .

### 3. 4. Ortogonaliu vektorių šeimų pavyzdžiai.

1. Sakykime, kad  $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  standartinė  $n$ -matė Euklido erdvė. Priminsime, kad skaliarinė daugyba šioje erdvėje apibrėžta taip:

$$\langle (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j,$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Akivaizdu, kad šios erdvės standartinė bazė  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra ortonormuota. Priminsime, kad  $e_j = (\delta_{j1}, \delta_{j2}, \dots, \delta_{jn})$ ,  $1 \leq j \leq n$ , čia  $\delta_{ij}$  – Kronekerio simbolis.

2. Sakykime, kad  $V = \mathbb{R}[t]$  visų polinomų su realaisiais koeficientais tiesinė erdvė, o skaliarinė daugyba šioje erdvėje apibrėžta taip:

$$\langle f(t), g(t) \rangle =: \int_{-1}^1 f(t)g(t)dt, \quad f(t), g(t) \in \mathbb{R}[t].$$

Ležandro polinomai  $P_j(t)$ ,  $j \geq 0$  yra apibrėžiami taip:

$$P_j(t) =: \frac{d^j}{dt^j} (t^2 - 1)^j, \quad j > 0, \quad P_0(t) =: 1.$$

**Teiginys.** Ležandro polinomai sudaro Euklido erdvės  $\mathbb{R}[t]$  ortogonaliaj bazę.

**Įrodymas.** Ležandro polinomo  $P_j(t)$  laipsnis yra lygus  $j$ ,  $j \geq 0$ . Vadinasi, šie polinomai sudaro tiesinės erdvės  $\mathbb{R}[t]$  bazę. Įrodysime, kad bet kurie du skirtini Ležandro polinomai yra ortogonalūs. Imkime  $P_r(t)$  ir  $P_s(t)$ ,  $r \neq s$ . Sakykime, kad  $r < s$ . Tuomet

$$\langle P_r(t), P_s(t) \rangle =: \int_{-1}^1 P_r(t)P_s(t)dt = \int_{-1}^1 \frac{dr}{dt^r} (t^2 - 1)^r \frac{ds}{dt^s} (t^2 - 1)^s dt.$$

Integruokime dalimis:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{dr}{dt^r} (t^2 - 1)^r \frac{ds}{dt^s} (t^2 - 1)^s dt &= \int_{-1}^1 \frac{dr}{dt^r} (t^2 - 1)^r d \frac{ds}{dt^{s-1}} (t^2 - 1)^s = \\ \frac{dr}{dt^r} (t^2 - 1)^r \frac{ds}{dt^{s-1}} (t^2 - 1)^s \Big|_{-1}^1 &- \int_{-1}^1 \frac{dr+1}{dt^{r+1}} (t^2 - 1)^r \frac{ds}{dt^{s-1}} (t^2 - 1)^s dt. \end{aligned}$$

Įsitikinkite, kad

$$\frac{d^r}{dt^r}(t^2 - 1)^r \frac{d^{s-1}}{dt^{s-1}}(t^2 - 1)^s \Big|_{-1} = 0.$$

Vadinasi,

$$\int_{-1}^1 \frac{d^r}{dt^r}(t^2 - 1)^r \frac{d^s}{dt^s}(t^2 - 1)^s dt = - \int_{-1}^1 \frac{d^{r+1}}{dt^{r+1}}(t^2 - 1)^r \frac{d^{s-1}}{dt^{s-1}}(t^2 - 1)^s dt.$$

Pakartojė integravimą dalimis  $m$  kartų, gausime:

$$\int_{-1}^1 \frac{d^r}{dt^r}(t^2 - 1)^r \frac{d^s}{dt^s}(t^2 - 1)^s dt = (-1)^m \int_{-1}^1 \frac{d^{r+m}}{dt^{r+m}}(t^2 - 1)^r \frac{d^{s-m}}{dt^{s-m}}(t^2 - 1)^s dt.$$

Jei  $m = s$ , tai

$$\int_{-1}^1 \frac{d^r}{dt^r}(t^2 - 1)^r \frac{d^s}{dt^s}(t^2 - 1)^s dt = (-1)^s \int_{-1}^1 (t^2 - 1)^s \frac{d^{r+s}}{dt^{r+s}}(t^2 - 1)^r dt = 0,$$

nes  $\frac{d^{r+s}}{dt^{r+s}}(t^2 - 1)^r = 0$  ( 2 r laipsnio polinomą išdiferencijavę  $r + s > 2r$  kartų, gauname 0).

Apskaičiuokite vektoriaus  $P_r(t)$  normos kvadrato

$$\langle P_r(t), P_r(t) \rangle = \int_{-1}^1 \frac{d^r}{dt^r}(t^2 - 1)^r \frac{d^r}{dt^r}(t^2 - 1)^r dt$$

reikšmę.

3. Sakykime, kad  $V = \mathbb{R}[t]$ , o skaliarinė daugyba šioje erdvėje apibrėžta taip:

$$\langle f(t), g(t) \rangle =: \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(t)e^{-t^2} dt, f(t), g(t) \in \mathbb{R}[t].$$

Ermito polinomai  $H_j(t)$ ,  $j \geq 0$ , yra apibrėžiami taip:

$$H_j(t) =: (-1)^j e^{t^2} \frac{d^j e^{-t^2}}{dt^j}, j > 0, H_0(t) =: 1.$$

Ermito polinomo  $H_j(t)$  laipsnis yra lygus  $j$ ,  $j \geq 0$ . Vadinasi, Ermito polinomai sudaro tiesinės erdvės  $\mathbb{R}[t]$  bazę. Kaip ir antrajame pavyzdyme galima įrodyti, kad bet kurie du skirtinti Ermito polinomai yra ortogonalūs.

**Pratimas.** Įrodykite, kad Ermito polinomams  $H_r$  ir  $F_s$ ,  $r < s$ , teisinga lygybė:

$$\langle H_r(t), H_s(t) \rangle =: \int_{-\infty}^{\infty} (-1)^{r+s} e^{t^2} \frac{d^r e^{-t^2}}{dt^r} e^{t^2} \frac{d^s e^{-t^2}}{dt^s} e^{-t^2} dt = 0.$$

**3. 5.** Skaliarinė daugyba  $F$  tiesinėje erdvėje  $V$  virš realiųjų skaičių kūno  $\mathbb{R}$ , – tai dar viena, – metrinė, – struktūra, apibrėžta aibėje  $V$  ir suderinta su tiesinės erdvės struktūra, apibrėžta toje pačioje aibėje  $V$ . Todėl svarbu apibrėžti dviejų Euklido erdviių tapatumo sąvoką, t. y. kaip suprasti skirtingai apibrėžtas Euklido erdves tų erdviių struktūrų požiūriu esančias vienodas.

**Apibrėžimas.** Euklido erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra vadinamos izomorfinėmis (arba izometrinėmis), jei egzistuoja bijekcija  $f : V \rightarrow W$ , tenkinanti sąlygas:

1. Atvaizdis  $f : V \rightarrow W$  yra tiesinis, t. y. bet kuriems  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $u, v \in V$ ,  $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$ ;
2. Bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $G(f(u), f(v)) = F(u, v)$ .

**Teorema.** Euklido erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra izomorfinės tada ir tik tada, kai tiesinių erdviių  $V$  ir  $W$  dimensijos  $\dim_{\mathbb{R}} V$  ir  $\dim_{\mathbb{R}} W$  yra lygios.

**Įrodymas.** Jei Euklido erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra izomorfinės, tai egzistuoja tiesinė bijekcija  $f : V \rightarrow W$ . Vadinas,  $\dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{R}} W$ .

Tarkime, kad  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra Euklido erdvės ir  $\dim_{\mathbb{R}} V = \dim_{\mathbb{R}} W = n$ . Irodysime, kad Euklido erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra izomorfinės.

Išsirinkime Euklido erdviių  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  ortonormuotas bazes atitinkamai  $v_1, v_2, \dots, v_n$  ir  $w_1, w_2, \dots, w_n$ . Tuomet tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow W$ ,  $f(v_j) = w_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra tiesinė bijekcija. Isitikinsime, kad bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ , teisinga lygybė:  $G(f(u_1), f(u_2)) = F(u_1, u_2)$ .

Sakykime,  $u_1 = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j$ ,  $u_2 = \sum_{j=1}^n \beta_j v_j$ . Tuomet

$$\begin{aligned} F(u_1, u_2) &= F\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \sum_{j=1}^n \beta_j v_j\right) = \\ &\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j F(v_i, v_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \delta_{ij} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j. \end{aligned}$$

Kita vertus,

$$\begin{aligned} G(f(u_1), f(u_2)) &= G\left(f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right), f\left(\sum_{j=1}^n \beta_j v_j\right)\right) = G\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i), \sum_{j=1}^n \beta_j f(v_j)\right) = \\ &\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j G(w_i, w_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \delta_{ij} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j. \end{aligned}$$

Kaip matome, bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ , teisinga lygybė:  $G(f(u_1), f(u_2)) = F(u_1, u_2)$ . Taigi Euklido erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra izomorfinės.  $\triangle$

**3. 6.** Sakykime,  $(V, F)$  yra Euklido erdvė,  $L$  – tiesinės erdvės  $V$  poerdvis. Apibrėžkime poaibį  $L^\perp$ , sudarytą iš tiesinės erdvės  $V$  visų tokiajų vektorių, kurių kiekvienas yra ortogonalus kiekvienam poerdvio  $L$  vektoriui. Matematiniai žymėjimai:

$$L^\perp =: \{u \in V \mid F(u, l) = 0, \quad l \in L\}.$$

**Teiginys.** Jei  $L$  yra Euklido erdvės  $(V, F)$  tiesinis poerdvis, tai  $L^\perp$  taip pat yra tiesinės erdvės  $V$  tiesinis poerdvis.

**Įrodymas.** Sakykime,  $u_1, u_2 \in L^\perp$ , t. y.  $u_1 \perp L, u_2 \perp L$  ir  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ . Tuomet kiekvienam  $l \in L$ ,

$$F(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2, l) = \alpha_1 F(u_1, l) + \alpha_2 F(u_2, l) = 0.$$

Vadinasi, jei  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}, u_1, u_2 \in L^\perp$ , tai ir  $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 \in L^\perp$ , t. y.  $L^\perp$  yra tiesinės erdvės  $V$  tiesinis poerdvis.  $\triangle$

**Teiginys.** Jei  $L$  yra Euklido erdvės  $(V, F)$  tiesinis poerdvis, tai  $V = L \oplus L^\perp$ .

**Įrodymas.** Sakykime, kad  $u_1, u_2, \dots, u_r$  – ortonormuota tiesinio poerdvio  $L$  bazė, o  $u_1, u_2, \dots, u_r, v'_1, v'_2, \dots, v'_s$  – tiesinės erdvės  $V$  bazė. Remiantis ortogonalizacijos algoritmu, tiesinės erdvės  $V$  bazę  $u_1, u_2, \dots, u_r, v'_1, v'_2, \dots, v'_s$  galima pertvarkyti į ortonormuotą bazę  $u_1, u_2, \dots, u_r, v_1, v_2, \dots, v_s$ . Akivaizdu, kad  $v_1, v_2, \dots, v_s \in L^\perp$ . Taigi  $V = L + L^\perp$ . Bet  $L \cap L^\perp = \{O\}$ . Iš tikrųjų: jei  $w \in L \cap L^\perp$ , tai  $w \perp w$  arba  $F(w, w) = 0$ , t. y.  $w = O$ . Taigi  $V = L \oplus L^\perp$ .  $\triangle$

Euklido erdvės  $(V, F)$  poerdvių  $L$  ir  $L^\perp$  tiesioginė sumą  $L \oplus L^\perp$  būtų galima pavadinti poerdvių  $L$  ir  $L^\perp$  ortogonaliaja suma todėl, kad kiekvienas poerdvio  $L$  vektorius yra ortogonalus kiekvienam poerdvio  $L^\perp$  vektoriui.

#### 4. Daugiamacių gretasienių tūriai

**4. 1.** Dabar aptarsime  $r$ -mačių gretasienių tūrių formules.

**Apibrėžimas.** Sakykime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė,  $v_1, v_2, \dots, v_r$  – šios erdvės vektorių šeima. Matrica

$$G(v_1, v_2, \dots, v_r) =: \begin{pmatrix} F(v_1, v_1) & F(v_1, v_2) & \dots & F(v_1, v_r) \\ F(v_2, v_1) & F(v_2, v_2) & \dots & F(v_2, v_r) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ F(v_r, v_1) & F(v_r, v_2) & \dots & F(v_r, v_r) \end{pmatrix}$$

Yra vadinama vektorių šeimos  $v_1, v_2, \dots, v_r$  Gramo matrica, o šios matricos determinantas  $\det G(v_1, v_2, \dots, v_r) = \det(F(v_i, v_j))_{i,j=1}^r$  – vektorių šeimos  $v_1, v_2, \dots, v_r$  Gramo determinantu. Vektorių šeimos  $v_1, v_2, \dots, v_r$  Gramo matrica gali būti užrašoma ir taip:  $(F(v_i, v_j))_{i,j=1}^r$ .

**Teiginys.** Jei Euklido erdvės  $(V, F)$  vektoriai  $u_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , yra tiesiškai išreiškiamieji vektoriai  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , t. y.  $u_j = \sum_{m=1}^r \alpha_{jm} v_m$ ,  $1 \leq j \leq r$ , tai  $\det G(u_1, u_2, \dots, u_r) = (\det(\alpha_{ij})_{i,j=1}^r)^2 \det G(v_1, v_2, \dots, v_r)$ .

**Įrodymas.** Jei  $u_j = \sum_{m=1}^r \alpha_{jm} v_m$ ,  $1 \leq j \leq r$ , tai išsiaiškinkime, kaip yra susiejusios vektorių šeimą  $u_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , ir  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , Gramo matricos. Taigi

$$\begin{aligned} G(u_1, u_2, \dots, u_r) &= (F(u_i, u_j))_{i,j=1}^r = \\ &= (F(\sum_{l=1}^r \alpha_{il} v_l, \sum_{m=1}^r \alpha_{jm} v_m))_{i,j=1}^r = (\sum_{l=1}^r \sum_{m=1}^r \alpha_{il} \alpha_{jm} F(v_l, v_m))_{i,j=1}^r. \end{aligned}$$

Remdamiesi pastaraja lygybe, matome: jei pažymėtume matricas  $(\alpha_{ij})_{i,j=1}^r$ ,  $(F(u_i, u_j))_{i,j=1}^r$  ir  $(F(v_i, v_j))_{i,j=1}^r$  raidėmis  $T$ ,  $G'$  ir  $G$ , tai galėtume parašyti:  $G' = TGT^t$ . Kadangi  $\det G' = \det G(u_1, u_2, \dots, u_r)$ ,  $\det G = \det G(v_1, v_2, \dots, v_r)$ , tai

$$\det G(u_1, u_2, \dots, u_r) = \det TG(v_1, v_2, \dots, v_r) \det T^t = (\det T)^2 \det G(v_1, v_2, \dots, v_r). \triangle$$

**Teiginys.** Sakykime,  $u_1, u_2, \dots, u_r$ , – Euklido erdvės  $(V, F)$  vektorių šeima, gauta ortogonalizavus tiesiškai nepriklausomų vektorių šeimą  $v_1, v_2, \dots, v_r$ . Tuomet

$$\det G(v_1, v_2, \dots, v_r) = \det G(u_1, u_2, \dots, u_r) = \prod_{j=1}^r F(u_j, u_j).$$

**Įrodymas.** Ortogonalizujant vektorių šeimą  $v_1, v_2, \dots, v_r$ , ortogonalizuotos vektorių šeimos vektoriai  $u_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , kaip matėme, yra išreiškiami taip: kiekvienam  $j$ ,  $1 \leq j \leq r$ ,

$$u_j = \alpha_{j-1,1} u_1 + \alpha_{j-1,2} u_2 + \dots + \alpha_{j-1,j-1} u_{j-1} + v_j, \quad \alpha_{lm} \in \mathbb{R}, \quad 1 \leq l, m \leq r-1.$$

Koefficientas  $\alpha_{00} = 0$ . Kadangi kiekvinam  $j$ ,  $1 \leq j \leq r$ ,

$$\mathbb{R}v_1 + \mathbb{R}v_2 + \dots + \mathbb{R}v_j = \mathbb{R}u_1 + \mathbb{R}u_2 + \dots + \mathbb{R}u_j,$$

tai vektoriai  $u_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , yra išreiškiamieji vektoriai  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , taip: kiekvienam  $j$ ,  $1 \leq j \leq r$ ,

$$u_j = \beta_{j-1,1} v_1 + \beta_{j-1,2} v_2 + \dots + \beta_{j-1,j-1} v_{j-1} + v_j, \quad \beta_{lm} \in \mathbb{R}, \quad 1 \leq l, m \leq r-1.$$

Koefficientas  $\beta_{00} = 0$ .

Kaip matome, perėjimo matrica iš vektorių šeimos  $v_1, v_2, \dots, v_r$ , į ortogonaliajį vektorių šeimą  $u_1, u_2, \dots, u_r$ , yra

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \beta_{11} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \beta_{21} & \beta_{22} & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \beta_{r-1,1} & \beta_{r-1,2} & \beta_{r-1,3} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Kadangi šios matricos determinantas yra lygus 1, tai

$$\det G(v_1, v_2, \dots, v_r) = \det G(u_1, u_2, \dots, u_r) = \prod_{j=1}^r F(u_j, u_j). \triangle$$

**4. 2. Išvada.** Sakykime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė,  $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$ , – tiesiškai nepriklausomi vektoriai,  $1 \leq r \leq \dim_{\mathbb{R}} V$ . Tuomet  $\det G(v_1, v_2, \dots, v_r) > 0$ .  $\det G(v_1, v_2, \dots, v_r) = 0$  tada ir tik tada, kai vektoriai  $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$  yra tiesiškai priklausomi.

**Įrodymas.** Jei Euklido erdvės  $(V, F)$  vektoriai  $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$ , yra tiesiškai nepriklausomi, tai šiuos vektorius ortogonalizavę, gauname ortogonalią tiesiškai nepriklausomą vektorių šeimą  $u_1, u_2, \dots, u_r$ . Taigi

$$\det G(v_1, v_2, \dots, v_r) = \det G(u_1, u_2, \dots, u_r) = \prod_{j=1}^r F(u_j, u_j) > 0.$$

$\det G(v_1, v_2, \dots, v_r) = 0$  tada ir tik tada, kai  $\prod_{j=1}^r F(u_j, u_j) = 0$ . Ši sandauga yra lygi nuliui tada ir tik tada, kai egzistuoja tokis  $j_0$ ,  $1 \leq j_0 \leq r$ , kad  $F(u_{j_0}, u_{j_0}) = 0$ , t. y. tada ir tik tada, kai  $u_{j_0} = O$ . Jei  $u_{j_0} = O$ , tai vektoriai  $v_1, v_2, \dots, v_{j_0}$  yra tiesiškai priklausomi, nes, kaip žinome,

$$\begin{aligned} \mathbb{R}v_1 + \mathbb{R}v_2 + \dots + \mathbb{R}v_{j_0} &= \mathbb{R}u_1 + \mathbb{R}u_2 + \dots + \mathbb{R}u_{j_0} = \\ &= \mathbb{R}u_1 + \mathbb{R}u_2 + \dots + \mathbb{R}u_{j_0-1} = \mathbb{R}v_1 + \mathbb{R}v_2 + \dots + \mathbb{R}v_{j_0-1}. \end{aligned}$$

Vadinasi, ir vektoriai  $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$  yra tiesiškai priklausomi.  $\triangle$

**4. 3.** Dabar galime pateikti dar vieną Koši-Buniakovskio-Švarco nelygybės įrodymą, kaip ką tik įrodytos išvados atskirą atvejį.

**Teiginys.** Tarkime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė. Tuomet bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $F(u, v)^2 \leq F(u, u)F(v, v)$  ir  $F(u, v)^2 = F(u, u)F(v, v)$  tada ir tik tada, kai vektoriai  $u$  ir  $v$  yra tiesiškai priklausomi.

**Įrodymas.** Jei  $u = O$ , tai abi nelygybės pusės yra lygios nuliui, o vektoriai  $u$  ir  $v$  tiesiškai priklausomi. Sakykime,  $u \neq O$ . Ortogonalizavę vektorius  $u, v$ , tarkime, gauname vektorius  $u = u'$  ir  $v'$ . Tuomet

$$\begin{aligned} F(u, u)F(v, v) - F(u, v)^2 &= \det \begin{pmatrix} F(u, u) & F(u, v) \\ F(v, u) & F(v, v) \end{pmatrix} = \\ &= \det \begin{pmatrix} F(u', u') & F(u', v') \\ F(v', u') & F(v', v') \end{pmatrix} = F(u', u')F(v', v') \geq 0, \end{aligned}$$

nes  $F(u', v') = 0$  (vektorai  $u'$  ir  $v'$  – ortogonalūs). Taigi  $F(u, u)F(v, v) - F(u, v)^2 \geq 0$ .  $F(u, u)F(v, v) - F(u, v)^2 = 0$  tada ir tik tada, kai  $F(u', u')F(v', v') = 0$ . Kadangi  $u = u' \neq O$ , tai  $F(v', v') = 0$ , t. y.  $v' = O$ . Bet  $v' = O$  tada ir tik tada, kai vektoriai  $u$  ir  $v$  yra tiesiškai priklausomi.  $\triangle$

#### 4. 4. $r$ -matis gretasienis. $r$ -mačio gretasienio $r$ -mačio tūrio kvadratas.

Sakykime,  $(V, F)$  – Euklido erdvė,  $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$  – tiesiškai nepriklausomi vektoriai.

**Aipibrėžimas.** Aibė  $\{\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_r v_r \mid 0 \leq \alpha_i \leq 1, 1 \leq i \leq r\}$  yra vadinama  $r$ -mačiu gretasieniu, užtemptu ant vektorių  $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$  ir žymima  $[v_1, v_2, \dots, v_r]$ . Šio gretasienio  $r$ -mačio tūrio kvadratu yra vadinama vektorių šeimos  $v_1, v_2, \dots, v_r$  Gramo determinanto  $\det G(v_1, v_2, \dots, v_r)$  reikšmė. Gretasienio  $[v_1, v_2, \dots, v_r]$  tūri sutarkime žymėsime  $\text{vol}[v_1, v_2, \dots, v_r]$ .

**Pastaba.** Tarkime,  $e_1, e_2, \dots, e_n$  – Euklido erdvės  $(V, F)$  ortonormuota bazė. Sakykime, kad

$$\begin{aligned} v_1 &= \alpha_{11}e_1 + \alpha_{12}e_2 + \dots + \alpha_{1n}e_n \\ v_2 &= \alpha_{21}e_1 + \alpha_{22}e_2 + \dots + \alpha_{2n}e_n \\ &\dots \quad \dots \dots \dots \\ v_n &= \alpha_{n1}e_1 + \alpha_{n2}e_2 + \dots + \alpha_{nn}e_n \end{aligned}$$

Irodysime, kad

$$\text{vol}[v_1, v_2, \dots, v_n] = |\det(\alpha_{ij})_{i,j=1}^n|.$$

Tūri  $\text{vol}[v_1, v_2, \dots, v_n]$  galime apskaičiuoti remdamiesi  $n$ -lypiais integralais. Kadangi

$$\begin{aligned} [v_1, v_2, \dots, v_n] &= \{\beta_1 v_1 + \dots + \beta_n v_n \mid 1 \leq \beta_j \leq 1, 1 \leq j \leq n\} = \\ &= \left\{ \sum_{j=1}^n \beta_j \alpha_{j1} e_1 + \dots + \sum_{j=1}^n \beta_j \alpha_{jn} e_n \mid 1 \leq \beta_j \leq 1, 1 \leq j \leq n \right\}, \end{aligned}$$

tai

$$\begin{aligned} \text{vol}[v_1, v_2, \dots, v_n] &= \int \int \dots \int_{\substack{t_1 = \beta_1 \alpha_{11} + \dots + \beta_n \alpha_{n1} \\ \dots \\ t_n = \beta_1 \alpha_{1n} + \dots + \beta_n \alpha_{nn} \\ 0 \leq \beta_1 \leq 1, \dots, 0 \leq \beta_n \leq 1}} dt_1 \dots dt_n = \\ &= \int_0^1 \dots \int_0^1 \left| \frac{D(t_1, \dots, t_n)}{D(\beta_1, \dots, \beta_n)} \right| d\beta_1 \dots d\beta_n = \\ &= \int_0^1 \dots \int_0^1 |\det(\alpha_{ij})_{i,j=1}^n| d\beta_1 \dots d\beta_n = |\det(\alpha_{ij})_{i,j=1}^n|. \end{aligned}$$

Gretasienio  $[v_1, v_2, \dots, v_n]$  tūri  $\text{vol}[v_1, v_2, \dots, v_n]$  dabar apskaičiuosome kitu būdu. Galime parašyti lygybę:

$$\begin{aligned} (\text{vol}[v_1, v_2, \dots, v_n])^2 &= \det G(v_1, v_2, \dots, v_n) = \\ &= (\det(\alpha_{ij})_{i,j=1}^n)^2 G(e_1, \dots, e_n) = (\det(\alpha_{ij})_{i,j=1}^n)^2. \end{aligned}$$

Vadinasi,

$$\text{vol}[v_1, v_2, \dots, v_n] = |\det(\alpha_{ij})_{i,j=1}^n|.$$

## 5. Unitariosios erdvės

**5. 1.** Sakykime, kad  $V$  – tiesinė erdvė virš kompleksinių skaičių kūno  $\mathbb{C}$ .

**Apibrėžimas.** Atvaizdis  $F : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$  yra vadinamas Ermito forma, apibrėžta tiesinėje erdvėje  $V$ , jei bet kuriems  $x, x_1, x_2, y \in V$ ,  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ ,

1.  $F(x, y) = \overline{F(y, x)}$ ;
2.  $F(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 F(x_1, y) + \alpha_2 F(x_2, y)$ .

Kaip matome, Ermito forma  $F$ , apibrėžta tiesinėje erdvėje  $V$ , esant fiksotam antrajam argumentui, yra tiesinė pagal pirmąjį argumentą. Irodysime, kad  $F$ , esant fiksotam pirmajam argumentui, yra taip vadinama pusiautiesinė pagal antrąjį argumentą. Ermito forma dažnai yra vadinama pusantrakart tiesine.

**Teiginys.** Jei  $F : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  yra Ermito forma, tai  $F$ , esant fiksotam pirmajam argumentui, yra pusiautiesinė pagal antrąjį argumentą, t. y. bet kuriems  $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ ,  $x, y_1, y_2 \in V$ ,

$$F(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} F(x, y_1) + \overline{\alpha_2} F(x, y_2).$$

**Irodymas.**

$$\begin{aligned} F(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) &= \overline{F(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2, x)} = \overline{\alpha_1 F(y_1, x) + \alpha_2 F(y_2, x)} = \\ &= \overline{\alpha_1 F(y_1, x)} + \overline{\alpha_2 F(y_2, x)} = \overline{\alpha_1} \overline{F(y_1, x)} + \overline{\alpha_2} \overline{F(y_2, x)} = \\ &= \overline{\alpha_1} F(x, y_1) + \overline{\alpha_2} F(x, y_2). \quad \triangle \end{aligned}$$

**Apibrėžimas.** Ermito forma  $F$  tiesinėje erdvėje  $V$  yra vadinama teigiamai apibrėžta, jei kiekvienam  $x \in V$ ,  $F(x, x) \geq 0$  ir  $F(x, x) = 0$  tada ir tik tada, kai  $x = O$ .

**Apibrėžimas.** Teigiamai apibrėžta Ermito forma  $F$  tiesinėje erdvėje  $V$  yra vadinama skaliarine daugyba, apibrėžta tiesinėje erdvėje  $V$ .

**5. 2. Apibrėžimas.** Jei tiesinėje erdvėje  $V$  yra apibrėžta skaliarinė daugyba  $F$ , tai tiesinė erdvė  $V$  skaliarinės daugybos  $F$  atžvilgiu yra vadinama unitariaja erdvė ir yra žymima  $(V, F)$ .

**Pastaba.** Dažniausiai skaliarinė daugyba unitarioje (ar tiesinėje) erdvėje  $V$  yra žymima  $\langle , \rangle$ . Mes skaliarinę daugybą unitarioje erdvėje  $V$  žymėsime tiek raide  $F$  ar dar kuria nors kita raide, tiek ir simboliu  $\langle , \rangle$ .

**Standartinės unitariosios erdvės pavyzdys.**

Nagrinėkime tiesinę erdvę

$$\mathbb{C}^n = \{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mid \alpha_j \in \mathbb{C}, 1 \leq j \leq n\}.$$

Apibrėžkime šioje erdvėje skaliarinę daugyba

$$\langle , \rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$$

taip: bet kuriems  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{C}^n$ ,

$$\langle(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)\rangle = \alpha_1\bar{\beta}_1 + \alpha_2\bar{\beta}_2 + \dots + \alpha_n\bar{\beta}_n.$$

Įsitikinkite, kad šis atvaizdis iš tikrujų yra skaliarinė daugyba tiesinėje erdvėje  $\mathbb{C}^n$ . Unitariajā erdvę  $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  vadinsime  $n$ -mate standartine unitariaja erdve.

**5. 3. Teiginys.** Tegu  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  unitarioji erdvė. Kaip ir Euklido erdvės atveju yra teisinga Švarco-Koši-Buniakovskio nelygybė: bet kuriems  $u, v \in V$ ,

$$|\langle u, v \rangle|^2 \leq \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle.$$

**Įrodymas.** Kadangi Ermito forma  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  teigiamai apibrėžta, tai bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $\lambda \in \mathbb{C}$  teisinga nelygybė:

$$\langle u - \lambda v, u - \lambda v \rangle \geq 0.$$

Šią nelygybę galime perrašyti taip:

$$\langle u, u \rangle - \lambda \langle v, u \rangle - \bar{\lambda} \langle u, v \rangle + \lambda \bar{\lambda} \langle v, v \rangle \geq 0. \quad (1)$$

Švarco-Koši-Buniakovskio nelygybė tuo atveju, kai  $v = O_V$ , akivaizdi. Galime tarti, kad  $v \neq O_V$ . I pirmąją lygibę vietoje  $\lambda$  išrašę  $\frac{\langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle}$ , gauname:

$$\langle u, u \rangle - \frac{\langle u, v \rangle \langle v, u \rangle}{\langle v, v \rangle} - \frac{\langle v, u \rangle \langle u, v \rangle}{\langle v, v \rangle} + \frac{\langle u, v \rangle \langle v, u \rangle \langle v, v \rangle}{\langle v, v \rangle^2} \geq 0.$$

Pertvarkę šią nelygybę, gauname:

$$\langle u, u \rangle \langle v, v \rangle - |\langle u, v \rangle|^2 \geq 0. \quad \triangle$$

**5. 4.** Kaip ir Euklido erdvės atveju unitariojoje erdvėje galime apibrėžti normos funkciją:

$$\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}_+, \|u\| =: \sqrt{\langle u, u \rangle}, \quad u \in V.$$

Kaip ir Euklido erdvės atveju normos funkcija turi savybes: bet kuriems  $u, v \in V, \alpha \in \mathbb{C}$ ,

1.  $\|\alpha u\| = |\alpha| \cdot \|u\|$ ;
2.  $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ ;
3.  $\|u\| \geq 0$ ,  $\|u\| = 0$  tada ir tik tada, kai  $u = O_V$ .

Kampo tarp unitariosios erdvės vektorių apibrėžti negalime, nes skaliarinė daugyba unitariojoje erdvėje įgyja reikšmes kompleksinių skaičių aibėje. Bet galima apibrėžti ortogonalumo sąvoką.

**Apibrėžimas.** Unitariosios erdvės  $V$  vektoriai  $u$  ir  $v$  yra vadinami ortogonaliais, jei  $\langle u, v \rangle = 0$ .

**Apibrėžimas.** Unitariosios erdvės  $V$  vektorių šeima  $u_1, u_2, \dots, u_r$  yra vadinama ortonormuota, jei  $\langle u_i, u_j \rangle = \delta_{ij}$ ,  $1 \leq i, j \leq r$ , čia  $\delta_{ij}$  – Kronekerio simbolis.

**Teiginys.** Unitariosios erdvės  $V$  ortonormuota vektorių šeima  $u_1, u_2, \dots, u_r$  yra tiesiskai nepriklausoma.

**Įrodymas.** Šio teiginio įrodymas toks pat, kaip ir Euklido erdvės atveju.

**5. 5. Teorema (Ortogonalizacijos algoritmas).** Sakykime,  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  – unitarioji erdvė. Egzistuoja algoritmas, vadintamas ortogonalizacijos algoritmu (procesu), kuriuo kiekvieną unitariosios erdvės  $V$  tiesiskai nepriklausomą vektorių šeimą  $v_1, v_2, \dots, v_s$  galima pertvarkyti į tokią ortonormuotą vektorių šeimą  $u_1, u_2, \dots, u_s$ , kad kiekvienam  $j$ ,  $1 \leq j \leq s$ ,

$$\mathbb{C}v_1 + \mathbb{C}v_2 + \dots + \mathbb{C}v_s = \mathbb{C}u_1 + \mathbb{C}u_2 + \dots + \mathbb{C}u_s.$$

**Įrodymas.** Šios teoremos įrodymas visiškai toks pat, kaip ir Euklido erdvės atveju.

**Išvada.** Kiekvienoje unitarioje erdvėje egzistuoja ortonormuota bazė.

**5. 6. Apibrėžimas.** Unitariosios erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra vadinamos izomorfinėmis (arba izometrinėmis), jei egzistuoja bijekcija  $f : V \rightarrow W$ , tenkinanti sąlygas:

1. Atvaizdis  $f : V \rightarrow W$  yra tiesinis, t. y. bet kuriems  $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ,  $u, v \in V$ ,  $f(\alpha u + \beta v) = \alpha f(u) + \beta f(v)$ ;

2. Bet kuriems  $u, v \in V$ ,  $G(f(u), f(v)) = F(u, v)$ .

**Teorema.** Unitariosios erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra izomorfinės tada ir tik tada, kai tiesinių erdvų  $V$  ir  $W$  dimensijos  $\dim_{\mathbb{C}} V$  ir  $\dim_{\mathbb{C}} W$  yra lygios.

**Įrodymas.** Jei unitariosios erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra izomorfinės, tai egzistuoja tiesinė bijekcija  $f : V \rightarrow W$ . Vadinasi,  $\dim_{\mathbb{C}} V = \dim_{\mathbb{C}} W$ .

Tarkime, kad  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra unitariosios erdvės ir  $\dim_{\mathbb{C}} V = \dim_{\mathbb{C}} W = n$ . Įrodykime, kad unitariosios erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra izomorfinės.

Išsirinkime unitariųjų erdvų  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  ortonormuotas bazes  $v_1, v_2, \dots, v_n$  ir  $w_1, w_2, \dots, w_n$ . Tuomet tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow W$ ,  $f(v_j) = w_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra tiesinė bijekcija. Isitikinsime, kad bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ , teisinga lygybė:  $G(f(u_1), f(u_2)) = F(u_1, u_2)$ .

Sakykime,  $u_1 = \sum_{j=1}^n \alpha_j v_j$ ,  $u_2 = \sum_{j=1}^n \beta_j v_j$ . Tuomet

$$\begin{aligned} F(u_1, u_2) &= F\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \sum_{j=1}^n \beta_j v_j\right) = \\ &\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \bar{\beta}_j F(v_i, v_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \bar{\beta}_j \delta_{ij} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \bar{\beta}_j. \end{aligned}$$

Kita vertus,

$$\begin{aligned} G(f(u_1), f(u_2)) &= G(f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right), f\left(\sum_{j=1}^n \beta_j v_j\right)) = G\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i), \sum_{j=1}^n \beta_j f(v_j)\right) = \\ &\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \bar{\beta}_j G(w_i, w_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \bar{\beta}_j \delta_{ij} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \bar{\beta}_j. \end{aligned}$$

Kaip matome, bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ , teisinga lygybė:  $G(f(u_1), f(u_2)) = F(u_1, u_2)$ . Taigi unitariosios erdvės  $(V, F)$  ir  $(W, G)$  yra izomorfinės.  $\triangle$

**Išvada.** Kiekviena  $n$ -matė unitarioji erdvė  $V$  yra izomorfinė (izometrinė) standartinei unitariajai erdvei  $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ .

**Įrodymas.** Tarkime,  $v_1, v_2, \dots, v_n$  – unitariosios erdvės  $V$  ortonormuota bazė,  $e_1, e_2, \dots, e_n$  – standartinės unitariosios erdvės  $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  standartinė ortonormuotoji bazė. Tuomet apibrėžkime tiesinį atvaizdą

$$V \ni u = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n \mapsto (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n.$$

Akivaizdu, kad šis atvaizdis yra nagrinėjamų unitariųjų erdvų izomorfizmas.  $\triangle$

**5. 7.** Sakykime,  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  yra unitarioji erdvė,  $L$  – tiesinės erdvės  $V$  tiesinis poerdvis. Apibrėžkime poaibį  $L^\perp$ , sudarytą iš tiesinės erdvės  $V$  visų tokiu vektorių, kurių kiekvienas yra ortogonalus kiekvienam poerdvio  $L$  vektoriui. Matematiniai žymėjimai:

$$L^\perp =: \{u \in V \mid F(u, l) = 0, \quad l \in L\}.$$

**Teiginys.** Jei  $L$  yra unitariosios erdvės  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  tiesinis poerdvis, tai  $L^\perp$  taip pat yra tiesinės erdvės  $V$  tiesinis poerdvis.

**Įrodymas.** Šio teiginio įrodymas toks pat, kaip ir Euklido erdvės atveju.

**Apibrėžimas.** Sakykime,  $(V, F)$  – unitarioji erdvė,  $v_1, v_2, \dots, v_r$  – šios erdvės vektorių šeima. Matrica

$$G(v_1, v_2, \dots, v_r) =: \begin{pmatrix} F(v_1, v_1) & F(v_1, v_2) & \dots & F(v_1, v_r) \\ F(v_2, v_1) & F(v_2, v_2) & \dots & F(v_2, v_r) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ F(v_r, v_1) & F(v_r, v_2) & \dots & F(v_r, v_r) \end{pmatrix}$$

yra vadinama vektorių šeimos  $v_1, v_2, \dots, v_r$  Gramo matrica, o šios matricos determinantas  $\det G(v_1, v_2, \dots, v_r) = \det(F(v_i, v_j))_{i,j=1}^r$  – vektorių šeimos  $v_1, v_2, \dots, v_r$  Gramo determinantu.

**Teiginys.** Sakykime, unitariosios erdvės  $(V, F)$  vektoriai  $u_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , yra tiesiškai išreiškiami vektoriais  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , t. y.  $u_j = \sum_{m=1}^r \alpha_{jm} v_m$ ,  $1 \leq j \leq r$ . Tuomet

$$\det G(u_1, u_2, \dots, u_r) = |\det(\alpha_{ij})_{i,j=1}^r|^2 \det G(v_1, v_2, \dots, v_r).$$

**Įrodymas.** Jei  $u_j = \sum_{m=1}^r \alpha_{jm} v_m$ ,  $1 \leq j \leq r$ , tai išsiaiškinkime, kaip yra susiejusios vektorių šeimų  $u_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , ir  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq r$ , Gramo matricos. Taigi

$$G(u_1, u_2, \dots, u_r) = (F(u_i, u_j))_{i,j=1}^r =$$

$$= (F(\sum_{l=1}^r \alpha_{il} v_l, \sum_{m=1}^r \alpha_{jm} v_m))_{i,j=1}^r = (\sum_{l=1}^r \sum_{m=1}^r \alpha_{il} \bar{\alpha}_{jm} F(v_l, v_m))_{i,j=1}^r.$$

Remdamiesi pastaraja lygybe, matome: jei pažymėtume matricas  $(\alpha_{ij})_{i,j=1}^r$ ,  $(F(u_i, u_j))_{i,j=1}^r$  ir  $(F(v_i, v_j))_{i,j=1}^r$  raidėmis  $T$ ,  $G'$  ir  $G$ , tai galėtume parašyti:  $G' = TGT^t$ , čia  $\bar{T}$  – matrica, sudaryta iš matricos  $T$  elementams kompleksiškai sujungtinių elementų. Kadangi  $\det G' = \det G(u_1, u_2, \dots, u_r)$ ,  $\det G = \det G(v_1, v_2, \dots, v_r)$ , tai

$$\det G(u_1, u_2, \dots, u_r) = \det T \det G(v_1, v_2, \dots, v_r) \overline{\det T^t} = |\det T|^2 \det G(v_1, v_2, \dots, v_r). \triangle$$

**Teiginys.** Sakykime,  $u_1, u_2, \dots, u_r$  – unitariosios erdvės  $(V, F)$  vektorių šeima, gauta ortogonalizavus tiesiškai nepriklausomų vektorių šeimą  $v_1, v_2, \dots, v_r$ . Tuomet

$$\det G(v_1, v_2, \dots, v_r) = \det G(u_1, u_2, \dots, u_r) = \prod_{j=1}^r F(u_j, u_j).$$

**Įrodymas.** Įrodymas toks pat, kaip ir Euklido erdvių atveju.

**Apibrėžimas.** Matrica  $A \in M_n(\mathbb{C})$  yra vadinama Ermito, jei  $A = \bar{A}^t$ .

**Apibrėžimas.** Ermito matrica  $A \in M_n(\mathbb{C})$  yra vadinama teigiamai apibrėžta, jei kiekvienam  $\underline{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{C}^n$ ,  $\underline{\alpha} \neq O$ ,  $\underline{\alpha} A \bar{\underline{\alpha}}^t > 0$ .

**Pratimas.** Įrodykite, kad unitariosios erdvės  $V$  kiekvienai tiesiškai nepriklausomai vektorių šeimai  $v_1, v_2, \dots, v_r$ , Gramo matrica

$$G(v_1, v_2, \dots, v_r) = \begin{pmatrix} F(v_1, v_1) & F(v_1, v_2) & \dots & F(v_1, v_r) \\ F(v_2, v_1) & F(v_2, v_2) & \dots & F(v_2, v_r) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ F(v_r, v_1) & F(v_r, v_2) & \dots & F(v_r, v_r) \end{pmatrix}$$

yra teigiamai apibrėžta Ermito matrica.

## 6. Unitarieji atvaizdžiai

**6. 1.** Sakykime,  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  – unitarioji erdvė,  $f : V \rightarrow V$  – tiesinis atvaizdis.

**Apibrėžimas.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra vadinamas unitariuoju, jei bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ ,  $\langle f(u_1), f(u_2) \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle$ .

Pirmiausia įrodysime keletą paprastų unitariojo atvaizdžio savybių.

**Teiginys.** Unitarusis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra bijektyvus.

**Įrodymas.** Tarkime, kad  $u \in \text{Ker } f$ . Tuomet  $\langle u, u \rangle = \langle f(u), f(u) \rangle = \langle O_V, O_V \rangle = 0$ . Vadinasi,  $u$  – nulinis vektorius, kitaip tariant  $\text{Ker } f = \{O_V\}$ . Remdamiesi lygybe

$$\dim_{\mathbb{C}} \text{Ker } f + \dim_{\mathbb{C}} \text{Im}(f) = \dim_{\mathbb{C}} V,$$

gauname  $\dim_{\mathbb{C}} \text{Im}(f) = \dim_{\mathbb{C}} V$ . Taigi unitarusis atvaizdis  $f$  yra bijektyvus.  $\triangle$

**6. 2. Teiginys.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$ , čia  $V$  – unitari erdvė, yra unitarus tada ir tik tada, kai unitarios erdvės  $V$  ortonormuotos bazės vaizdas yra ortonornuota bazė.

**Įrodymas.** Tegu  $f : V \rightarrow V$  yra unitarus atvaizdis, o  $e_1, e_2, \dots, e_n$  – unitarios erdvės  $V$  ortonormuota bazė. Tuomet bet kuriems  $i, j$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ ,

$$\langle f(e_i), f(e_j) \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}. \quad (1)$$

Čia  $\delta_{ij}$  yra Kronekerio simbolis. Priminsime, kad

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{jei } i = j, \\ 0, & \text{jei } i \neq j. \end{cases}$$

Remdamiesi (1) lygybe, matome, kad unitarios erdvės ortonormuotos bazės  $e_1, e_2, \dots, e_n$  vaizdas  $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$  yra ortonormuota bazė.

Tegu  $f : V \rightarrow V$  yra toks tiesinis atvaizdis, kad unitarios erdvės  $V$  ortonormuotos bazės  $e_1, e_2, \dots, e_n$  vaizdas  $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$  yra ortonormuota bazė, t. y. bet kuriems  $i, j$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ ,

$$\langle e_i, e_j \rangle = \langle f(e_i), f(e_j) \rangle = \delta_{ij}.$$

Įrodysime, kad bet kuriems vektoriams  $u_1, u_2 \in V$  teisinga lygybė:

$$\langle f(u_1), f(u_2) \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle.$$

Vektorius  $u_1, u_2 \in V$  išreiškė unitarios erdvės  $V$  bazės vektoriais  $e_1, e_2, \dots, e_n$

$$u_1 = \sum_{r=1}^n \alpha_r e_r, \quad u_2 = \sum_{s=1}^n \beta_s e_s,$$

gauname

$$\begin{aligned} \langle f(u_1), f(u_2) \rangle &= \left\langle \sum_{r=1}^n \alpha_r f(e_r), \sum_{s=1}^n \beta_s f(e_s) \right\rangle = \sum_{r,s=1}^n \alpha_r \bar{\beta}_s \langle f(e_r), f(e_s) \rangle = \\ &= \sum_{r,s=1}^n \alpha_r \bar{\beta}_s \langle e_r, e_s \rangle = \left\langle \sum_{r=1}^n \alpha_r e_r, \sum_{s=1}^n \beta_s e_s \right\rangle = \langle u_1, u_2 \rangle. \end{aligned}$$

Kaip matome,  $f$  yra unitarus atvaizdis.  $\triangle$

**Teiginys.** Visi unitarieji atvaizdžiai  $f : V \rightarrow V$  atvaizdžių kompozicijos  $\circ$  atžvilgiu sudaro grupę, kuri yra vadinama unitariajų ir yra žymima  $U(V)$ .

**Įrodymas.** Pirmiausia įsitikinsime, kad unitarių atvaizdžių kompozicija yra unitarus atvaizdis. Sakykime  $f, g$  – unitarūs atvaizdžiai. Tuomet bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ ,

$$\langle (f \circ g)(u_1), (f \circ g)(u_2) \rangle = \langle (f(g(u_1))), (f(g(u_2))) \rangle =$$

$$\langle g(u_1), g(u_2) \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle.$$

Kaip matome,  $f \circ g$  yra unitarus atvaizdis. Taigi visų unitarių atvaizdžių aibė  $U(V)$  yra stabili unitarių atvaizdžių kompozicijos atžvilgiu. Dabar įsitikinsime, kad unitarių atvaizdžių kompozicijos dėsnis tenkina grupės apibrėžimo aksiomas.

1. Atvaizdžių kompozicija yra asociatyvus kompozicijos dėsnis;
2. Tapatusis atvaizdis  $\text{id} : V \rightarrow V$  akivaizdžiai yra unitarus atvaizdis;
3. Kiekvienam unitariajam atvaizdžiui  $f \in U(V)$  egzistuoja atvirkštinis atvaizdis  $f^{-1}$ , nes, kaip anksčiau įsitikinome, kiekvienas unitarusis atvaizdis yra bijektyvus. Lieka įsitikinti, kad  $f^{-1}$  yra unitarus atvaizdis.

Sakykime,  $u_1, u_2 \in V$ . Tuomet

$$\begin{aligned} \langle u_1, u_2 \rangle &= \langle (f \circ f^{-1})(u_1), (f \circ f^{-1})(u_2) \rangle = \\ &= \langle f(f^{-1}(u_1)), f(f^{-1}(u_2)) \rangle = \langle f^{-1}(u_1), f^{-1}(u_2) \rangle. \end{aligned}$$

Remdamiesi šia lygybe, matome, kad  $f^{-1}$  yra unitarus atvaizdis. Taigi įrodėme, kad  $U(V)$  yra grupė.  $\triangle$

**6. 3. Apibrėžimas.** Matrica  $A \in M_n(\mathbb{C})$  yra vadinama unitariaja, jei  $A\bar{A}^t = \mathbf{1}_n$ . Brūkšnelis virš matricos  $A$  žymi, kad matricos  $A$  kiekvienas koeficientas yra pakeičiamas kompleksiniu sujungtiniu skaičiumi.

**Teiginys.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$ , čia  $V$  – unitari erdvė, yra unitarus tada tik tada, kai jo matrica unitarios erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje yra unitari.

**Įrodymas.** Sakykime,  $f : V \rightarrow V$  – unitarus atvaizdis,  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra unitarios erdvės  $V$  ortonormuota bazė. Sakykime, unitaraus atvaizdžio matrica tiesinės erdvės  $V$  bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra  $(\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$ , t. y.  $f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j$ ,  $1 \leq i \leq n$ . Kadangi  $f$  unitarus atvaizdis, tai bet kuriems  $r, s$ ,  $1 \leq r, s \leq n$ ,

$$\langle f(e_r), f(e_s) \rangle = \langle e_r, e_s \rangle = \delta_{rs}.$$

Čia  $\delta_{rs}$  yra Kronekerio simbolis. Iš lygybės  $\langle f(e_r), f(e_s) \rangle = \delta_{rs}$ ,  $1 \leq r, s \leq n$ , išrašę vektorių  $f(e_i)$ ,  $1 \leq i \leq n$ , išraiškas bazės  $e_1, e_2, \dots, e_n$  vektoriais

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j, \quad 1 \leq i \leq n,$$

gauname:

$$\begin{aligned} \left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_{rj} e_j, \sum_{m=1}^n \alpha_{sm} e_m \right\rangle &= \sum_{j=1}^n \alpha_{rj} \sum_{m=1}^n \bar{\alpha}_{sm} \langle e_j, e_m \rangle = \\ &= \sum_{j,m=1}^n \alpha_{rj} \bar{\alpha}_{sm} \delta_{j,m} = \sum_{j=1}^n \alpha_{rj} \bar{\alpha}_{sj} = \delta_{rs}, \quad 1 \leq r, s \leq n. \end{aligned}$$

Pažymėjė  $A = (\alpha_{rj})_{r,s=1}^n$ , remdamiesi lygybėmis

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{rj} \bar{\alpha}_{sj} = \delta_{rs}, \quad 1 \leq r, s \leq n,$$

matome, kad  $A\bar{A}^t = \mathbf{1}_n$ . Taigi įrodėme, kad unitaraus atvaizdžio  $f$  matrica  $A$  unitarios erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje yra unitari.

Dabar sakykime, kad tiesinio atvaizdžio  $f : V \rightarrow V$  matrica  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  unitarios erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra unitari. Įrodysime, kad tiesinis atvaizdis  $f$  yra unitarus. Galime parašyti lygybes:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_n = A\bar{A}^t \implies \delta_{rs} &= \sum_{j=1}^n \alpha_{rj} \bar{\alpha}_{sj} = \sum_{j,m=1}^n \alpha_{rj} \bar{\alpha}_{sm} \delta_{j,m} = \\ \sum_{j=1}^n \alpha_{rj} \sum_{m=1}^n \bar{\alpha}_{sm} \langle e_j, e_m \rangle &= \left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_{rj} e_j, \sum_{m=1}^n \alpha_{sm} e_m \right\rangle = \langle f(e_r), f(e_s) \rangle, \quad 1 \leq r, s \leq n. \end{aligned}$$

Kaip matome,

$$\langle f(e_r), f(e_s) \rangle = \langle e_r, e_s \rangle = \delta_{rs}, \quad 1 \leq r, s \leq n,$$

t. y. ortonormuotos bazės  $e_1, e_2, \dots, e_n$  vaizdas  $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$  yra ortonormuota bazė. Remdamiesi teginiu [6. 2.], gauname, kad  $f$  yra unitarus atvaizdis.  $\triangle$

**6. 4.** Nagrinėkime standartinę  $n$ -matę unitariajų erdvę  $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ . Priminsime, kad

$$\langle (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \bar{\beta}_j.$$

Šios erdvės standartinė bazė  $e_j = (\delta_{j1}, \delta_{j2}, \dots, \delta_{jn})$ , čia  $\delta_{ij}$  – Kronekerio simbolis, yra ortonormuota. Kiekvienam unitariam atvaizdžiui  $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$  tiesinės erdvės standartinėje ortonormuotoje bazėje vienareikšmiškai yra priskiriamas unitari matrica  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$ ,

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Pažymėjė visų  $n$ -tos eilės unitariųjų matricų aibę  $U(n)$ , galime nagrinėti atvaizdį  $F : U(\mathbb{C}^n) \rightarrow U(n)$ ,  $F(f) = A$ ,  $A$  – unitariojo atvaizdžio  $f$  matrica tiesinės erdvės  $\mathbb{C}^n$  standartinėje bazėje. Atvaizdis  $F$  yra bijektyvus.

**Teiginys.** Visų  $n$ -tos eilės unitariųjų matricų aibė  $U(n)$  matricų daugybos atžvilgiu yra grupė.

**Įrodymas.** Pirmiausia įsitikinsime, kad aibė  $U(n)$  yra stabili matricų daugybos atžvilgiu. Jei  $A, B \in U(n)$ , tai  $A\bar{A}^t = \mathbf{1}_n$ ,  $B\bar{B}^t = \mathbf{1}_n$ . Tuomet

$$(AB)\overline{(AB)}^t = (AB)\bar{B}^t \bar{A}^t = A(B\bar{B}^t)\bar{A}^t = A\mathbf{1}_n \bar{A}^t = A\bar{A}^t = \mathbf{1}_n,$$

t. y.  $AB$  yra unitari matrica.

Įsitikinsime, kad  $U(n)$  matricų daugybos atžvilgiu yra grupė. Akivaizdu, kad

1. Matricų daugyba yra asociatyvi;
2.  $\mathbf{1}_n \in U(n)$  – tai akivaizdu;

3. Jei  $A \in U(n)$ , tai  $AA^t = \mathbf{1}_n$ , t. y.  $A^{-1} = A^t$ . Galime parašyti:  $\bar{A}^t \bar{A}^{t^t} = \bar{A}^t A = \mathbf{1}_n$ .

Kaip matome,  $A^{-1} = \bar{A}^t \in U(n)$ .

Taigi  $U(n)$  matricų daugybos atžvilgiu yra grupė.  $\triangle$

**Teiginys.** Atvaizdis  $F : U(\mathbb{C}^n) \rightarrow U(n)$  yra antihomomorfizmas, t. y., bet kuriems  $f, g \in U(\mathbb{C}^n)$ ,  $F(f \circ g) = F(g)F(f)$ .

**Įrodymas.** Sakykime,  $f, g \in U(\mathbb{C}^n)$ ,

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j, g(e_i) = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} e_j, 1 \leq i \leq n.$$

Tuomet

$$(f \circ g)(e_i) = f(g(e_i)) = f\left(\sum_{j=1}^n \beta_{ij} e_j\right) = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} f(e_j) = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \sum_{r=1}^n \alpha_{jr} e_r =$$

$$\sum_{r=1}^n \left( \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \alpha_{jr} \right) e_r = \sum_{r=1}^n \gamma_{ir} e_r, 1 \leq i \leq n,$$

čia  $\gamma_{ir} = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \alpha_{jr}$ ,  $1 \leq i, r \leq n$ . Pažymėję  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$ ,  $B = (\beta_{ij})_{i,j=1}^n$ ,  $C = (\gamma_{ij})_{i,j=1}^n$ , gauname:  $C = BA$ . Taigi matome, kad, jei  $F(f) = A$ ,  $F(g) = B$ , tai  $F(f \circ g) = C = BA = F(g)F(f)$ .  $\triangle$

**6. 5.** Kadangi unitarioji matrica  $A$  tenkina sąlygą  $A\bar{A}^t = \mathbf{1}_n$ , tai

$$\det(A\bar{A}^t) = \det A \overline{\det A^t} = |\det A|^2 = 1,$$

t. y.  $|\det A| = 1$ .

#### 6. 6. Unitaraus atvaizdžio (unitarios matricos) spektras.

Sakykime,  $f : V \rightarrow V$  yra unitarus atvaizdis,  $\phi_f(t)$  – šio atvaizdžio charakteringasis polinomas. Kadangi  $V$  yra tiesinė erdvė virš kūno  $\mathbb{C}$ , tai, remiantis pagrindine algebro teorema, egzistuoja polinomo  $\phi_f(t)$  šaknis  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Tuomet egzistuoja tiesinio atvaizdžio  $f$  tikrinis vektorius  $u \in V$ , atitinkantis tikrinę reikšmę  $\lambda$ . Vadinas, galime parašyti lygybę:

$$f(u) = \lambda u, u \in V, \lambda \in \mathbb{C}.$$

Kadangi  $f$  yra unitarus atvaizdis, tai

$$\langle u, u \rangle = \langle f(u), f(u) \rangle = \langle \lambda u, \lambda u \rangle = \lambda \bar{\lambda} \langle u, u \rangle.$$

Remdamiesi šia lygybe, gauname  $\lambda\bar{\lambda} = 1$ , t. y.  $\lambda \in S^1 \subset \mathbb{C}$  ( $S^1$  – vienetinio spindulio apskritimas kompleksinėje plokštumoje).

**Išvada.** Unitaraus atvaizdžio  $f$  spektras (atvaizdžio  $f$  charakteringojo polinomo  $\phi_f(t)$  visų šaknų visuma) priklauso kompleksinės plokštumos vienetinio spindulio apskritimui  $S^1$ .

**6. 7. Teorema (unitaraus atvaizdžio spektrinis išskaidymas).** Sakykime,  $f : V \rightarrow V$  yra unitarus atvaizdis. Egzistuoja unitarios erdvės  $V$  ortonormuota bazė, sudaryta iš unitaraus atvaizdžio  $f$  tikrinių vektorių.

**Įrodymas.** Sakykime,  $\lambda_1 \in S^1$  yra tiesinio atvaizdžio  $f$  charakteringojo polinomo  $\phi_f(t)$  šaknis,  $u_1 \in V$  – tiesinio atvaizdžio  $f$  normuotas tikrinis vektorius (t. y. tokis, kurio ilgis yra lygus 1), atitinkantis tikrinę reikšmę  $\lambda_1$ . Sudarykime poerdvi  $L = \mathbb{C}u_1$ , – vektoriaus  $u_1$  tiesinį apvalkalą. Tuomet unitarią erdvę  $V$  galime išskaidyti į tarpusavy ortogonalų poerdvius  $L$  ir  $L^\perp$  tiesioginę sumą:

$$V = L \oplus L^\perp.$$

Isitikinsime, kad  $L^\perp$  yra  $f$  - invariantinis poerdis (priminsime, kad reikia įrodyti :  $v \in L^\perp \implies f(v) \in L^\perp$ ). Sakykime, kad  $v \in L^\perp$ , t. y.  $\langle u_1, v \rangle = 0$  (kitaip tariant  $u_1 \perp v$ ). Tuomet

$$\langle f(u_1), f(v) \rangle = \langle u_1, v \rangle = 0.$$

Kita vertus

$$\langle f(u_1), f(v) \rangle = \langle \lambda u_1, f(v) \rangle = \lambda \langle u_1, f(v) \rangle = 0.$$

Kadangi  $\lambda \in S^1$ , t. y.  $\lambda \neq 0$ , tai  $\langle u_1, f(v) \rangle = 0$ . Kaip matome,  $u_1 \perp f(v)$ , t. y.  $f(v) \in L^\perp$ . Irodėme, kad  $L^\perp$  yra  $f$  - invariantinis poerdis. Tarę, kad teoremos teiginys yra įrodytas kiekvienam unitariam atvaizdžiui  $g : N \rightarrow N$ , kai  $\dim_{\mathbb{C}} N < \dim_{\mathbb{C}} V$ , tai teoremos įrodyma galime užbaigti matematinės indukcijos metodu. Mūsų atveju  $\dim_{\mathbb{C}} L^\perp < \dim_{\mathbb{C}} V$ ,  $f|_{L^\perp} : L^\perp \rightarrow L^\perp$  yra unitarus atvaizdis.  $\triangle$

**6. 8. Išvada.** Kiekvienai unitariai matricai  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  egzistuoja tokia unitari matrica  $B$ , kad matrica  $BAB^{-1} = D$  – istrižaininė matrica, kurios istrižainė yra sudaryta iš matricos  $A$  tikrinių reikšmių.

**Įrodymas.** Nagrinėkime standartinę  $n$ -matę unitarią erdvę  $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ . Šios erdvės standartinė ortonormuota bazė yra  $e_j = (\delta_{j1}, \delta_{j2}, \dots, \delta_{jn})$ , čia  $\delta_{ij}$  – Kronekerio simbolis. Atvaizdis  $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ ,  $f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j$ ,  $1 \leq i \leq n$ , yra unitarus, nes šio atvaizdžio matrica

$A$  tiesinės erdvės  $\mathbb{C}^n$  ortonormuotoje bazėje  $e_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra unitari. Remdamiesi teorema apie unitaraus atvaizdžio spektrinį išskaidymą, imkime tiesinės erdvės ortonormuotą bazę  $\tilde{e}_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , sudarytą iš unitaraus atvaizdžio  $f$  tikrinių vektorių. Sakykime, kad perėjimo matrica iš bazės  $e_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , į bazę  $\tilde{e}_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra  $B$ . Kadangi bazės  $e_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , ir  $\tilde{e}_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra ortonormuotos, tai matrica  $B$  yra unitari. Tiesinio atvaizdžio  $f$  matrica bazėje  $\tilde{e}_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra  $BAB^{-1}$ . Tiesinio atvaizdžio  $f$  matricą bazėje  $\tilde{e}_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , užrašykime remdamiesi apibrėžimu:  $f(\tilde{e}_j) = \lambda_j \tilde{e}_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , nes  $\tilde{e}_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra  $f$  -

tikriniai vektoriai, o  $\lambda_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , – tiesinio atvaizdžio  $f$  tikrinės reikšmės. Vadinasi,

$$BAB^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_j \in S^1, 1 \leq j \leq n. \quad \triangle$$

### 6. 9. Specialioji $n$ -tos eilės unitariųjų matricų grupė $SU(n)$ .

Nagrinėkime  $n$ -tos eilės unitariųjų matricų, kurių determinantas lygus 1, aibę  $SU(n)$ , t. y.  $SU(n) =: \{A \in U(n) | \det A = 1\}$ . Kadangi  $\det(AB) = \det A \det B$ , tai  $SU(n)$  matricų daugybos atžvilgiu yra grupė. Ši grupė yra grupės  $U(n)$  normalusis pogrupis. Atvaizdis  $\det : U(n) \rightarrow S^1$ , čia  $S^1 = \{z \in \mathbb{C} | |z| = 1\}$ , yra siurjektyvus. Iš tikrujų: jei  $z \in S^1$ , tai matricos

$$\begin{pmatrix} z & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

determinantas yra lygus  $z$ . Atvaizdžio  $\det : U(n) \rightarrow S^1$  branduolys  $\text{Ker } \det = SU(n)$ . Vadinasi, faktorgrupė  $U(n)/SU(n)$  yra izomorfina grupei  $S^1 = U(1)$ .

### 6. 10. Grupė $SU(2)$ .

Išsamiau ištirsime grupę  $SU(2)$ . Sakykime, kad

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}, A \in SU(2).$$

Tuomet  $\bar{A}^t = A^{-1}$ , t. y.

$$\begin{pmatrix} \bar{\alpha} & \bar{\gamma} \\ \bar{\beta} & \bar{\delta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \delta & -\beta \\ -\gamma & \alpha \end{pmatrix}.$$

Vadinasi,  $\gamma = -\bar{\beta}$ ,  $\delta = \bar{\alpha}$ . Taigi matrica  $A$ , priklausanti grupei  $SU(2)$ , atrodo taip:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}, |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Pažymėkime  $\alpha = x_1 + x_2i$ ,  $\beta = x_3 + x_4i$ ,  $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$ ,  $i^2 = -1$ . Lygybė  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$  naujas žymėjimais atrodo taip:  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$ . Visų keturmatės erdvės  $\mathbb{R}^4$  vektorių, kurių koordinatės tenkina lygtį  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$ , galai užpildo spindulio  $r = 1$  trimatę sferą  $S^3$ . Taigi matricą

$$A = \begin{pmatrix} x_1 + x_2i & x_3 + x_4i \\ -x_3 + x_4i & x_1 - x_2i \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}, \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1,$$

sutapatinę su keturmatės erdvės  $\mathbb{R}^4$  vektoriumi  $(x_1, x_2, x_3, x_4)$ ,  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$ , gauname, kad visos matricos

$$A = \begin{pmatrix} x_1 + x_2i & x_3 + x_4i \\ -x_3 + x_4i & x_1 - x_2i \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}, \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1,$$

sudaro keturmaręje erdvėje  $\mathbb{R}^4$  trimatę sferą  $S^3$ . Nepaprastai įdomus tas faktas, kad trimatėje sferoje  $S^3$  tokiu būdu galima apibrėžti grupės struktūrą. Kaip matėme,  $S^1 = U(1)$  yra komutatyvi grupė, tuo tarpu, grupė  $S^3$  nėra komutatyvi.

**6. 11.** Nurodysime įdomų ryšį tarp matricų aibės

$$\mathbf{H} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 + x_2 i & x_3 + x_4 i \\ -x_3 + x_4 i & x_1 - x_2 i \end{pmatrix} | x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\}$$

ir kvaternionų nekomutatyvaus kūno  $\mathbb{H}$ . Priskyrę matricai

$$\begin{pmatrix} x_1 + x_2 i & x_3 + x_4 i \\ -x_3 + x_4 i & x_1 - x_2 i \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R},$$

kvaternioną  $x_1 + x_2 i + x_3 j + x_4 k \in \mathbb{H}$ , gauname atvaizdą

$$f : \mathbf{H} \rightarrow \mathbb{H}.$$

Akivaizdu, kad atvaizdis  $f$  adityvus:  $f(A + B) = f(A) + f(B)$ ,  $A, B \in \mathbf{H}$ . Įsitikinsime, kad atvaizdis  $f$  turi ir tokias savybes:

1.  $f(AB) = f(A)f(B)$ ,  $A, B \in \mathbf{H}$ ;
2.  $\det = \text{Nm} \circ f$ .

Priminsime:

$$\text{Nm}(x_1 + x_2 i + x_3 j + x_4 k) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2, \quad x_1 + x_2 i + x_3 j + x_4 k \in \mathbb{H}.$$

Dabar įsitikinsime, kad  $f$  turi savybę:  $f(AB) = f(A)f(B)$ ,  $A, B \in \mathbf{H}$ . Tuo tikslu nagrinėkime matricas

$$\begin{pmatrix} x_1 + x_2 i & x_3 + x_4 i \\ -x_3 + x_4 i & x_1 - x_2 i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 + y_2 i & y_3 + y_4 i \\ -y_3 + y_4 i & y_1 - y_2 i \end{pmatrix}, \quad x_j, y_j \in \mathbb{R}, \quad 1 \leq j \leq 4.$$

Tiesiogiai patikrinti, sudauginus šias matricas, kad  $f$  turi įrodinėjamą savybę, pakankamai sudėtinga. Šias matricas užrašykime taip:

$$\begin{pmatrix} x_1 + x_2 i & x_3 + x_4 i \\ -x_3 + x_4 i & x_1 - x_2 i \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} y_1 + y_2 i & y_3 + y_4 i \\ -y_3 + y_4 i & y_1 - y_2 i \end{pmatrix} = y_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y_2 \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} + y_3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + y_4 \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

$x_j, y_j \in \mathbb{R}, 1 \leq j \leq 4$ . Remiantis tuo, kad matricų sudėtis ir daugyba yra susieti distribuatyvumo dėsniais:  $(A + B)C = AC + BC$ ,  $C(A + B) = CA + CB$ , pakanka įsitikinti, kad matricos

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix},$$

tarpysavy yra dauginamos taip, kaip ir kvaternionai  $1, i, j, k$ . Bet tai akivaizdu.

Atvaizdžio  $f$  savybė  $\det = \text{Nm} \circ f$  akivaizdi, nes matricos

$$A = \begin{pmatrix} x_1 + x_2i & x_3 + x_4i \\ -x_3 + x_4i & x_1 - x_2i \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R}$$

determinantas  $\det A$ , kaip ir kvaterniono  $x_1 + x_2i + x_3j + x_4k$  norma  $\text{Nm}(x_1 + x_2i + x_3j + x_4k)$ , yra lygus  $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ . Taigi atvaizdis  $f : \mathbf{H} \rightarrow \mathbb{H}$  yra bijektyvus žiedų homomorfizmas. Bet kadangi  $\mathbb{H}$  yra nekomutatyvus kūnas, tai matricų aibė  $\mathbf{H}$  matricų sudėties ir daugybos atžvilgiu yra taip pat nekomutatyvus kūnas, izomorfinis  $\mathbb{H}$ . Visos matricos  $A \in \mathbf{H}$ , kurių determinantas yra lygus 1, sudaro grupę  $SU(2)$ , izomorfinę kvaternionų, kurių norma yra lygi 1, grupei

$$\{x_1 + x_2i + x_3j + x_4k \in \mathbb{H} \mid \text{Nm}(x_1 + x_2i + x_3j + x_4k) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1\}.$$

**6. 12.** Pasinaudojė anksčiau nurodytu ryšiu tarp kvaternionų nekomutatyvaus kūno  $\mathbb{H}$  ir matricų aibės

$$\mathbf{H} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 + x_2i & x_3 + x_4i \\ -x_3 + x_4i & x_1 - x_2i \end{pmatrix}, \quad x_1, x_2, x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\},$$

išsiaiškinkime grupės

$$S^3 = SU(2) = \{x_1 + x_2i + x_3j + x_4k \in \mathbb{H} \mid \text{Nm}(x_1 + x_2i + x_3j + x_4k) = 1\}$$

kai kurias savybes.

**Apibrėžimas.** Kvaternioną  $\alpha i + \beta j + \gamma k \in \mathbb{H}$  vadinsime gryna menamu.

**Teiginys.** Visų grynai menamų kvaternionų, kurių norma yra lygi vienam, aibė

$$\{\alpha i + \beta j + \gamma k \in \mathbb{H} \mid \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1\}$$

yra dvimatė sfera  $S^2 \subset S^3$ . Kiekvienas gryna menamas kvaternionas, kurio norma yra lygi vienam, pakeltas kvadratu yra lygus  $-1$ .

**Įrodymas.** Visiškai akivaizdu, kad aibę

$$\{\alpha i + \beta j + \gamma k \in \mathbb{H} \mid \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1\}$$

galima sutapatinti su aibe

$$\{(0, \alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^4 \mid \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1\} = S^2 \subset S^3.$$

Pakelę grynai menamą kvaternioną  $\alpha i + \beta j + \gamma k \in \mathbb{H}$ ,  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ , kvadratu, gauname:

$$(\alpha i + \beta j + \gamma k)^2 = -(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) = -1. \quad \triangle$$

**6. 13.** Kaip matome, kvaternionų nekomutatyviame kūne  $\mathbb{H}$  lygties  $x^2 + 1 = 0$  sprendiniai sudaro dvimatę sferą  $S^2$ , tuo tarpu,  $n$ -ojo laipsnio lygtis  $f(x) = 0$ ,  $f(x) \in k[x]$ , komutatyviajame kūne  $k$  negali turėti daugiau nei  $n$  sprendinių (šaknų).

**6. 14.** Dabar nagrinėsime grupę  $SU(2) = S^3$  ir išsiaiškinsime elemento  $i \in S^3$  sujungtinių elementų klasę

$$\{(x_1 + x_2i + x_3j + x_4k) i (x_1 + x_2i + x_3j + x_4k)^{-1} \mid x_1 + x_2i + x_3j + x_4k \in S^3\}.$$

Elementas

$$(x_1 + x_2i + x_3j + x_4k) i (x_1 + x_2i + x_3j + x_4k)^{-1},$$

$x_1 + x_2i + x_3j + x_4k \in S^3$ , yra lygus elementui

$$(x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2)i + (2x_1x_4 + 2x_2x_3)j + (-2x_1x_3 + 2x_2x_4)k.$$

Kaip matome, elementui  $i \in S^3$  sujungtinių elementų klasė yra grupės  $S^3$  gryna menamų elementų poaibis. Ar šis poaibis sutampa su grupės  $S^3$  gryna menamų elementų poaibiu? Jei taip yra, tai kiekvienam rinkiniui  $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$ , tenkinančiam sąlygą  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ , lygčių sistema

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 = \alpha \\ 2x_1x_4 + 2x_2x_3 = \beta \\ -2x_1x_3 + 2x_2x_4 = \gamma \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1 \end{cases}$$

turi bent vieną sprendinį realaisiais skaičiais. Ištirti šią lygčių sistemą ne taip paprasta. I anksčiau suformuluotą klausimą ieškosime atsakymo visiškai kitaip.

**6. 15.** Gryna menamam kvaternionui  $\alpha i + \beta j + \gamma k \in S^3$ , atitinka matrica

$$A = \begin{pmatrix} \alpha i & \beta + \gamma i \\ -\beta + \gamma i & -\alpha i \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}, \quad \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1.$$

Nagrinėsime gryna menamus kvaternionus  $\alpha i + \beta j + \gamma k \in S^3$ , nelygius  $i$ , t. y., kai  $\alpha \neq 1$ , nes norime išsiaiškinti, kokie iš jų priklauso elemento  $i$  sujungtinių elementų klasei. Kaip matome, matrica  $A$  yra grupės  $SU(2)$  elementas. Šios matricos charakteringasis polinomas  $\phi_A(t) = t^2 + 1$ , Vadinasi, šios matricos tikrinės reikšmės yra  $\pm i \in \mathbb{C}$ . Remdamiesi išvada (žr.[6. 7.]), gauname, kad egzistuoja tokia unitarioji matrica  $T$ , kad

$$TAT^{-1} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

Rasime matricą  $T$ . Tuo tikslu rasime matricos  $A$  tikrinius vektorius, atitinkančius tikrines reikšmes  $i$  ir  $-i$ .

Galite išsitikinti, kad  $(\beta - \gamma i, i(\alpha - 1))$  yra matricos  $A$  tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę reikšmę  $i$ , o  $(i(\alpha - 1), \beta + \gamma i)$  – tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę reikšmę  $-i$ . Tuomet matrica  $T$  yra tokia:

$$\begin{pmatrix} \frac{\beta - \gamma i}{\sqrt{2(1-\alpha)}} & \frac{i(\alpha-1)}{\sqrt{2(1-\alpha)}} \\ \frac{i(\alpha-1)}{\sqrt{2(1-\alpha)}} & \frac{\beta + \gamma i}{\sqrt{2(1-\alpha)}} \end{pmatrix}, \quad \alpha \neq 1.$$

Dabar galime nurodyti ir lygčių sistemas

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 = \alpha \\ 2x_1x_4 + 2x_2x_3 = \beta \\ -2x_1x_3 + 2x_2x_4 = \gamma \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1 \end{cases}$$

sprendinį: bet kuriems  $\alpha, \beta, \gamma$ , tenkinantiems sąlygas  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1, \alpha \neq 1$ ,  $x_1 = \frac{\beta}{\sqrt{2(1-\alpha)}}, x_2 = \frac{\gamma}{\sqrt{2(1-\alpha)}}, x_3 = 0, x_4 = \frac{\sqrt{2(1-\alpha)}}{2}$ .

### Pratimas.

Raskite kvaternionui  $\alpha + \beta i + \gamma j + \delta k$  sujungtinių elementų klasę.

## 7. Ermito atvaizdžiai

**7. 1.** Sakykime,  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  – unitarioji erdvė,  $f : V \rightarrow V$  – tiesinis atvaizdis.

**Apibrėžimas.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra vadinamas Ermito, jei bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ ,  $\langle f(u_1), u_2 \rangle = \langle u_1, f(u_2) \rangle$ .

**Teiginys.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra Ermito tada ir tik tada, jei untariosios erdvės  $V$  kurios nors bazės vektoriams  $v_1, v_2, \dots, v_n$ ,  $\langle f(v_i), v_j \rangle = \langle v_i, f(v_j) \rangle$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ .

**Įrodymas.** Jei  $f$  yra Ermito atvaizdis, tai, remdamiesi Ermito atvaizdžio apibrėžimu, gauname, kad  $\langle f(v_i), v_j \rangle = \langle v_i, f(v_j) \rangle$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ .

Sakykime, kad untariosios erdvės  $V$  kurios nors bazės vektoriams  $v_1, v_2, \dots, v_n$ ,

$$\langle f(v_i), v_j \rangle = \langle v_i, f(v_j) \rangle, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

Tegu vektoriai  $u_1, u_2 \in V$ . Užrašykime vektorių  $u_1$  ir  $u_2$  išraiškas unitariosios erdvės  $V$  bazės vektoriais  $v_1, v_2, \dots, v_n$ :  $u_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i$ ,  $u_2 = \sum_{j=1}^n \beta_j v_j$ . Tuomet

$$\begin{aligned} \langle f(u_1), u_2 \rangle &= \left\langle f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right), \sum_{j=1}^n \beta_j v_j \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i), \sum_{j=1}^n \beta_j v_j \right\rangle = \\ &\sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{j=1}^n \bar{\beta}_j \langle f(v_i), v_j \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{j=1}^n \bar{\beta}_j \langle v_i, f(v_j) \rangle = \\ &\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \sum_{j=1}^n \beta_j f(v_j) \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, f\left(\sum_{j=1}^n \beta_j v_j\right) \right\rangle = \langle u_1, f(u_2) \rangle. \quad \triangle \end{aligned}$$

Priminsime, kad matrica  $A \in M_n(\mathbb{C})$  yra vadinama Ermito, jei  $A = \bar{A}^t$ .

**Teiginys.** Sakykime,  $V$  yra unitarioji erdvė. Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra Ermito tada ir tik tada, jei tiesinio atvaizdžio  $f$  matrica  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  unitariosios erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra Ermito.

**Įrodymas.** Sakykime,  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra unitarios erdvės  $V$  ortonormuota bazė,  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  – tiesinio atvaizdžio  $f$  matrica bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$  (t. y.  $f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j$ ,  $1 \leq i \leq n$ ).

Tarkime, kad  $f$  yra Ermito atvaizdis. Tuomet, remdamiesi Ermito atvaizdžio apibrėžimu, galime parašyti lygybes:

$$\langle f(e_i), e_j \rangle = \langle e_i, f(e_j) \rangle, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

I šias lygybes įrašę bazinių vektorių vaizdus  $f(e_i)$ ,  $1 \leq i \leq n$ , išreikštus bazės vektoriais  $e_1, e_2, \dots, e_n$ , gauname:

$$\begin{aligned} \langle f(e_i), e_j \rangle = \langle e_i, f(e_j) \rangle, \quad 1 \leq i, j \leq n, &\iff \left\langle \sum_{r=1}^n \alpha_{ir} e_r, e_j \right\rangle = \langle e_i, \sum_{s=1}^n \alpha_{js} e_s \rangle, \quad 1 \leq i, j \leq n, \iff \\ \sum_{r=1}^n \alpha_{ir} \langle e_r, e_j \rangle = \sum_{s=1}^n \bar{\alpha}_{js} \langle e_i, e_s \rangle, \quad 1 \leq i, j \leq n, &\iff \\ \sum_{r=1}^n \alpha_{ir} \delta_{rj} = \sum_{s=1}^n \bar{\alpha}_{js} \delta_{is}, \quad 1 \leq i, j \leq n, &\iff \alpha_{ij} = \bar{\alpha}_{ji}, \quad 1 \leq i, j \leq n. \end{aligned}$$

Lygybės  $\alpha_{ij} = \bar{\alpha}_{ji}$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ , yra ekvivalentios matricų lygybei  $A = \bar{A}^t$ . Kaip matome, Ermito atvaizdžio  $f$  matrica unitariosios erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$ , yra Ermito matrica.

Sakykime, kad tiesinio atvaizdžio  $f : V \rightarrow V$  matrica  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  unitariosios erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra Ermito. Tuomet matricų lygybė  $A = \bar{A}^t$  užrašyta jų koeficientams atrodo taip:  $\alpha_{ij} = \bar{\alpha}_{ji}$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ . Remdamiesi šiomis lygybėmis, gauname  $\langle f(e_i), e_j \rangle = \langle e_i, f(e_j) \rangle$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ . Vadinas,  $f$  yra Ermito atvaizdis.  $\triangle$

## 7. 2. Ermito atvaizdžio (Ermito matricos) spektras.

**Teiginys.** Sakykime,  $V$  yra unitarioji erdvė. Ermito atvaizdžio  $f : V \rightarrow V$  spektras (t. y. tiesinio atvaizdžio  $f$  charakteringojo polinomo  $\phi_f(t)$  visų šaknų visuma) yra sudarytas iš realiųjų skaičių.

**Įrodymas.** Tarkime, kad  $f : V \rightarrow V$  yra Ermito atvaizdis. Unitarioji erdvė  $V$  yra apibrėžta virš kūno  $\mathbb{C}$ . Kadangi kūnas  $\mathbb{C}$  yra algebraiskai uždaras, tai tiesinio atvaizdžio  $f$  charakteringasis polinomas  $\phi_f(t)$  turi šaknį  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Sakykime, kad  $u \in V$  yra tiesinio atvaizdžio  $f$  tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę reikšmę  $\lambda$ . Tuomet galime parašyti:

$$\langle f(u), u \rangle = \langle u, f(u) \rangle \implies \langle \lambda u, u \rangle = \langle u, \lambda u \rangle \implies \lambda \langle u, u \rangle = \bar{\lambda} \langle u, u \rangle.$$

Kadangi  $u$  nenulinis vektorius, tai  $\langle u, u \rangle \neq 0$ . Vadinas,  $\lambda = \bar{\lambda}$ , t. y.  $\lambda \in \mathbb{R}$ .  $\triangle$

## 7. 3. Išvada.

Kiekvienos Ermito matricos tikrinės reikšmės yra realios.

**7. 4. Teorema (Ermito atvaizdžio spektrinės išskaidymas).** Sakykime,  $V$  yra unitarioji erdvė,  $f : V \rightarrow V$  – Ermito atvaizdis. Tuomet egzistuoja unitariosios erdvės  $V$  ortonormuota bazė, sudaryta iš Ermito atvaizdžio  $f$  tikriųjų vektorių.

**Įrodymas.** Sakykime,  $\lambda_1$  yra Ermito atvaizdžio  $f$  tikrinė reikšmė,  $u_1$  – tiesinio atvaizdžio  $f$  tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę reikšmę  $\lambda_1$ . Tegu vektoriaus  $u_1$  ilgis yra lygus 1, nes priešingu atveju ji galime normuoti. Unitariosios erdvės  $V$  tiesinis poerdvis  $L = \mathbb{C}u_1$  yra  $f$  invariantinis,  $f(u_1) = \lambda_1 u_1$ . Unitariajų erdvę  $V$  galime išskaidyti į tarpusavy ortogonalinių tiesinių poerdvių  $L$  ir  $L^\perp$  tiesioginę sumą  $V = L \oplus L^\perp$ . Įsitiksime, kad tiesinis poerdvis  $L^\perp$  yra  $f$  invariantinis, t. y. įrodysime, kad

$$v \in L^\perp \implies f(v) \in L^\perp.$$

Sakykime, kad  $v \in L^\perp$ , t. y.  $\langle u_1, v \rangle = 0$ . Tuomet

$$\langle u_1, f(v) \rangle = \langle f(u_1), v \rangle = \langle \lambda_1 u_1, v \rangle = \lambda_1 \langle u_1, v \rangle = 0.$$

Kaip matome, jei  $v \in L^\perp$ , tai ir  $f(v) \in L^\perp$ . Tarę, kad teoremos teiginys yra įrodytas kiekvienam Ermito atvaizdžiui  $g : N \rightarrow N$ , kai  $\dim_{\mathbb{C}} N < \dim_{\mathbb{C}} V$ , tai teoremos įrodyma galime užbaigti matematinės indukcijos metodu. Mūsų atveju  $\dim_{\mathbb{C}} L^\perp < \dim_{\mathbb{C}} V$ ,  $f|_{L^\perp} : L^\perp \rightarrow L^\perp$  yra Ermito atvaizdis.  $\triangle$

**7. 5. Teiginys.** Kiekvienai Ermito matricai  $A$  egzistuoja tokia unitari matrica  $T$ , kad

$$TAT^{-1} = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad 1 \leq j \leq n.$$

Čia  $\lambda_j \in \mathbb{R}$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra matricos  $A$  tikrinės reikšmės.

**Įrodymas.** Tarkime, kad  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  yra Ermito matrica. Nagrinėkime standartinę unitariajų erdvę  $(\mathbb{C}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ , kurioje yra apibrėžta standartine skaliarine daugyba

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}, \langle (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \bar{\beta}_j,$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{C}^n.$$

Šio erdvės bazė  $e_j = (\delta_{j1}, \delta_{j2}, \dots, \delta_{jn})$ ,  $1 \leq j \leq n$  yra ortonormuota. Apibrėžkime tiesinį atvaizdį  $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ ,  $f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j$ ,  $1 \leq i \leq n$ . Kadangi tiesinio atvaizdžio  $f$  matrica

$A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  unitariosios erdvės  $\mathbb{C}^n$  ortonormuotoje bazėje  $e_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra Ermito, tai  $f$  yra Ermito atvaizdis. Vadinas, remiantis teorema apie Ermito atvaizdžio spektrinį išskaidymą, egzistuoja unitariosios erdvės  $\mathbb{C}^n$  ortonormuota bazė  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , sudaryta iš Ermito atvaizdžio  $f$  tikriniu vektorių. Perėjimo matrica  $T$  iš ortonormuotos bazės  $e_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , į ortonormuotą bazę  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra unitari. Ermito atvaizdžio  $f$  matrica bazėje  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra

$$TAT^{-1} = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad 1 \leq j \leq n.$$

Akivaizdu, kad  $\lambda_j \in \mathbb{R}$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra matricos  $A$  tikrinės reikšmės.  $\triangle$

### Pavyzdžiai.

1. Nagrinėkime visų antros eilės Ermito matricų aibę  $\text{Erm (2)} = \{A \in M_2(\mathbb{C}) | A = \bar{A}^t\}$ . Antros eilės bendrosios Ermito matricos išraiška yra tokia:

$$A = \begin{pmatrix} a & b+ci \\ b-ci & d \end{pmatrix}, a, b, c, d \in \mathbb{R}, i^2 = -1.$$

Remdamiesi antros eilės bendrosios Ermito matricos išraiška, matome, kad dviejų Ermito matricų suma yra Ermito matrica. Vadinasi, aibė  $\text{Erm (2)}$  yra stabili matricų sudėties + atžvilgiu. Akivaizdu, kad  $(\text{Erm (2)}, +)$  yra Abelio grupė.

Ermito matricą padaugine, pavyzdžiui, iš kompleksinio skaičiaus  $i$ , gausime matricą, kuri nėra Ermito. Taigi aibė  $\text{Erm (2)}$  nėra stabili matricų daugybos iš kompleksinių skaičių atžvilgiu. Vadinasi, grupė  $(\text{Erm (2)}, +)$  nėra tiesinė erdvė virš kompleksinių skaičių kūno  $\mathbb{C}$ .

Ermito matricą padaugine iš realiojo skaičiaus, gausime Ermito matricą. Atvaizdis

$$\mathbb{R} \times \text{Erm (2)} \rightarrow \text{Erm (2)}$$

yra apibrėžtas. Abelio grupė  $(\text{Erm (2)}, +)$  yra tiesinė erdvė virš realiųjų skaičių kūno  $\mathbb{R}$ . Akivaizdu, kad  $\dim_{\mathbb{R}} \text{Erm (2)} = 4$ . Matricos

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

sudaro tiesinės erdvės  $\text{Erm (2)}$  virš  $\mathbb{R}$  bazę. Šios matricos labai svarbios teorinėje fizikoje. Fizikoje paskutiniosios trys matricos yra vadinamos Paulio matricomis, ižymaus fiziko Paulio vardu.

Matricų

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

tiesinį apvalkalą su realaisiais koeficientais sutarkime žymėti  $\text{Erm}_0(2)$ . Kitaip tariant,

$$\text{Erm}_0(2) = \{A \in \text{Erm (2)} | \text{Tr} A = 0\}.$$

Akivaizdu, kad  $\dim_{\mathbb{R}} \text{Erm}_0(2) = 3$ .

2. Kievienu Ermito matricą  $A \in \text{Erm (2)}$ , padauginus iš kompleksinio skaičiaus  $i$ , yra gaunama įstrižai Ermito matrica  $B = iA$  (matrica  $B$  yra vadinama įstrižai Ermito, jei  $B + \bar{B}^t = 0$ ). Tiesinės erdvės  $i\text{Erm (2)} =: \{iA | A \in \text{Erm (2)}\}$  ir  $\text{Erm (2)}$  virš kūno  $\mathbb{R}$  yra izomorfines.

Yra glaudus ryšys tarp grupės  $SU(2)$  ir įstrižai Ermito matricų tiesinės erdvės  $i\text{Erm (2)}$  tiesinio poerdvio  $i\text{Erm}_0(2)$ . Nagrinėkime atvaizdį

$$\exp : i\text{Erm}_0(2) \rightarrow SU(2),$$

$$\exp(iA) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{i^j}{j!} A^j, A \in \text{Erm}_0(2).$$

Dabar įsitikinsime, kad matricos  $iA$ , priklausančios tiesiniai erdvei  $i\text{Erm}_0(2)$ , vaizdas  $\exp(iA)$  priklauso grupei  $SU(2)$ . Nagrinėkime matricos  $iA$ ,  $A \in \text{Erm}_0(2)$ , eksponentę, kai

$$A = \begin{pmatrix} a & b + ci \\ b - ci & -a \end{pmatrix}.$$

$$\exp(iA) = \exp\left(i \begin{pmatrix} a & b + ci \\ b - ci & -a \end{pmatrix}\right) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{i^j}{j!} \begin{pmatrix} a & b + ci \\ b - ci & -a \end{pmatrix}^j.$$

Matricos  $A$  kvadratas yra lygus

$$\begin{pmatrix} a & b + ci \\ b - ci & -a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b + ci \\ b - ci & -a \end{pmatrix} = (a^2 + b^2 + c^2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R}.$$

Kaip matome, matricos  $A$   $2j$ -asis laipsnis yra lygus  $(a^2 + b^2 + c^2)^j \mathbf{1}_2$ , o  $2j+1$ -asis laipsnis yra lygus  $(a^2 + b^2 + c^2)^j A$ . Vadinas,

$$\begin{aligned} \exp(iA) &= \exp\left(i \begin{pmatrix} a & b + ci \\ b - ci & -a \end{pmatrix}\right) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{i^j}{j!} A^j = \\ &\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j)!} A^{2j} + i \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} A^{2j+1} = \\ &\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j)!} (a^2 + b^2 + c^2)^j \mathbf{1}_2 + i \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j}{(2j+1)!} (a^2 + b^2 + c^2)^j A. \end{aligned}$$

Pasinaudojė formulėmis:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{(2j+1)!},$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j x^{2j}}{(2j)!}$$

ir atlikę veiksmus, gauname matrica:

$$\exp(iA) = \begin{pmatrix} \cos \omega + \frac{ai}{\omega} \sin \omega & \frac{-c+bi}{\omega} \sin \omega \\ \frac{c+bi}{\omega} \sin \omega & \cos \omega - \frac{ai}{\omega} \sin \omega \end{pmatrix},$$

čia  $\omega = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ . Dabar akivaizdu, kad matrica  $\exp(iA) \in SU(2)$ , kai  $A \in \text{Erm}_0(2)$ .

$SU(2)$  yra taip vadinama Li grupe virš realiųjų skaičių kūno  $\mathbb{R}$ , o  $i\text{Erm}_0(2)$  – Li grupės  $SU(2)$  Li algebra.

## 8. Ortogonalieji atvaizdžiai

**8. 1.** Sakykime,  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  – Euklido erdvė,  $f : V \rightarrow V$  – tiesinis atvaizdis.

**Apibrėžimas.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra vadinamas ortogonaliuoju, jei bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ ,  $\langle f(u_1), f(u_2) \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle$ .

Pirmiausia irodysime keletą paprastų ortogonaliojo atvaizdžio savybių.

**Teiginys.** Ortogonalusis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra bijektyvus.

**Įrodymas.** Tarkime, kad  $u \in \text{Ker } f$ . Tuomet  $\langle u, u \rangle = \langle f(u), f(u) \rangle = \langle O_V, O_V \rangle = 0$ . Vadinasi,  $u$  – nulinis vektorius, kitaip tariant,  $\text{Ker } f = \{O_V\}$ . Remdamiesi lygybe  $\dim_{\mathbb{R}} \text{Ker } f + \dim_{\mathbb{R}} f(V) = \dim_{\mathbb{R}} V$ , gauname  $\dim_{\mathbb{R}} f(V) = \dim_{\mathbb{R}} V$ . Taigi ortogonalusis atvaizdis  $f$  yra bijektyvus.  $\triangle$

**8. 2. Teiginys.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$ , čia  $V$  – Euklido erdvė, yra ortogonalus tada ir tik tada, kai Euklido erdvės ortonormuotos bazės yra ortonornuota bazė.

**Įrodymas.** Tegu  $f : V \rightarrow V$  yra ortogonalus atvaizdis, o  $e_1, e_2, \dots, e_n$  – Euklido erdvės  $V$  ortonormuota bazė. Tuomet bet kuriems  $i, j$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ ,

$$\langle f(e_i), f(e_j) \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}, \quad (1)$$

čia  $\delta_{ij}$  yra Kronekerio simbolis. Remdamiesi (1) lygybe, matome, kad Euklido erdvės ortonormuotos bazės  $e_1, e_2, \dots, e_n$  vaizdas  $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$  yra ortonormuota bazė.

Tegu  $f : V \rightarrow V$  yra toks tiesinis atvaizdis, kad Euklido erdvės  $V$  ortonormuotos bazės  $e_1, e_2, \dots, e_n$  vaizdas  $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$  yra ortonormuota bazė, t. y. bet kuriems  $i, j$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ ,

$$\langle e_i, e_j \rangle = \langle f(e_i), f(e_j) \rangle = \delta_{ij}.$$

Irodysime, kad bet kuriems vektoriams  $u_1, u_2 \in V$  teisinga lygybė:

$$\langle f(u_1), f(u_2) \rangle = \langle u_1, u_2 \rangle.$$

Vektorius  $u_1, u_2 \in V$  išreiškė Euklido erdvės  $V$  bazės vektoriais  $e_1, e_2, \dots, e_n$

$$u_1 = \sum_{r=1}^n \alpha_r e_r, \quad u_2 = \sum_{s=1}^n \beta_s e_s,$$

gauname

$$\begin{aligned} \langle f(u_1), f(u_2) \rangle &= \left\langle \sum_{r=1}^n \alpha_r f(e_r), \sum_{s=1}^n \beta_s f(e_s) \right\rangle = \sum_{r,s=1}^n \alpha_r \beta_s \langle f(e_r), f(e_s) \rangle = \\ &= \sum_{r,s=1}^n \alpha_r \beta_s \langle e_r, e_s \rangle = \left\langle \sum_{r=1}^n \alpha_r e_r, \sum_{s=1}^n \beta_s e_s \right\rangle = \langle u_1, u_2 \rangle. \end{aligned}$$

Kaip matome,  $f$  yra ortogonalus atvaizdis.  $\triangle$

**Teiginys.** Visi ortogonalieji atvaizdžiai  $f : V \rightarrow V$  atvaizdžių kompozicijos  $\circ$  atžvilgiu sudaro grupę, kuri yra vadinama ortogonaliaja ir yra žymima  $O(V)$ .

**Įrodymas.** Pirmiausia įsitikinsime, kad ortogonaliuju atvaizdžių kompozicija yra ortogonalusis atvaizdis. Sakykime  $f, g$  – ortogonalieji atvaizdžiai. Tuomet bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ ,

$$\begin{aligned}\langle (f \circ g)(u_1), (f \circ g)(u_2) \rangle &= \langle (f(g(u_1)), (f(g(u_2))) \rangle = \\ \langle g(u_1), g(u_2) \rangle &= \langle u_1, u_2 \rangle.\end{aligned}$$

Kaip matome,  $f \circ g$  yra ortogonalusis atvaizdis. Taigi visų ortogonaliuju atvaizdžių aibė  $O(V)$  yra stabili ortogonaliuju atvaizdžių kompozicijos atžvilgiu. Dabar įsitikinsime, kad ortogonaliuju atvaizdžių kompozicijos dėsnis tenkina grupės apibrėžimo aksiomas.

1. Atvaizdžių kompozicija yra asociatyvus kompozicijos dėsnis;
2. Tapatusis atvaizdis  $\text{id} : V \rightarrow V$  akivaizdžiai yra ortogonalusis atvaizdis;
3. Kiekvienam ortogonaliajam atvaizdžiui  $f \in U(V)$  egzistuoja atvirkštinis atvaizdis  $f^{-1}$ , nes, kaip anksčiau įsitikinome, kiekvienas ortogonalusis atvaizdis yra bijektyvus. Lieka įsitikinti, kad  $f^{-1}$  yra ortogonalusis atvaizdis.

Sakykime,  $u_1, u_2 \in V$ . Tuomet

$$\begin{aligned}\langle u_1, u_2 \rangle &= \langle (f \circ f^{-1})(u_1), (f \circ f^{-1})(u_2) \rangle = \\ \langle f(f^{-1}(u_1)), f(f^{-1}(u_2)) \rangle &= \langle f^{-1}(u_1), f^{-1}(u_2) \rangle.\end{aligned}$$

Remdamiesi šia lygybe, matome, kad  $f^{-1}$  yra ortogonalus atvaizdis. Taigi įrodėme, kad  $O(V)$  yra grupė.  $\triangle$

**8. 3. Apibrėžimas.** Matrica  $A \in M_n(\mathbb{R})$  yra vadinama ortogonaliaja, jei  $AA^t = \mathbf{1}_n$ .

**Teiginys.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$ , čia  $V$  – Euklido erdvė, yra ortogonalusis tada tik tada, kai jo matrica Euklido erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje yra ortogonalė.

**Įrodymas.** Tegu  $f : V \rightarrow V$  – ortogonalusis atvaizdis,  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra Euklido erdvės  $V$  ortonormuota bazė. Sakykime, ortogonalaus atvaizdžio  $f$  matrica tiesinės erdvės  $V$  bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra  $(\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$ , t. y.

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Kadangi  $f$  ortogonalus atvaizdis, tai bet kuriems  $r, s$ ,  $1 \leq r, s \leq n$ ,

$$\langle f(e_r), f(e_s) \rangle = \langle e_r, e_s \rangle = \delta_{rs},$$

I lygybe  $\langle f(e_r), f(e_s) \rangle = \delta_{rs}$ ,  $1 \leq r, s \leq n$ , įrašę vektorių  $f(e_i)$ ,  $1 \leq i \leq n$ , išraiškas bazės  $e_1, e_2, \dots, e_n$  vektoriais, gauname:

$$\left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_{rj} e_j, \sum_{m=1}^n \alpha_{sm} e_m \right\rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_{rj} \sum_{m=1}^n \alpha_{sm} \langle e_j, e_m \rangle =$$

$$= \sum_{j,m=1}^n \alpha_{rj}\alpha_{sm}\delta_{jm} = \sum_{j=1}^n \alpha_{rj}\alpha_{sj} = \delta_{rs}, \quad 1 \leq r, s \leq n.$$

Pažymėję  $A = (\alpha_{rj})_{r,s=1}^n$ , remdamiesi lygybėmis

$$\sum_{j=1}^n \alpha_{rj}\alpha_{sj} = \delta_{rs}, \quad 1 \leq r, s \leq n,$$

matome, kad  $AA^t = \mathbf{1}_n$ . Taigi įrodėme, kad ortogonalaus atvaizdžio  $f$  matrica  $A$  Euklido erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje yra ortogonalė.

Dabar sakykime, kad tiesinio atvaizdžio  $f : V \rightarrow V$  matrica  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  Euklido erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra ortogonalė. Įrodysime, kad tiesinis atvaizdis  $f$  yra ortogonalus.

Galime parašyti lygybes:

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_n = AA^t &\implies \delta_{rs} = \sum_{j=1}^n \alpha_{rj}\alpha_{sj} = \sum_{j,m=1}^n \alpha_{rj}\alpha_{sm}\delta_{jm} = \\ &\sum_{j=1}^n \alpha_{rj} \sum_{m=1}^n \alpha_{sm} \langle e_j, e_m \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n \alpha_{rj} e_j, \sum_{m=1}^n \alpha_{sm} e_m \right\rangle = \langle f(e_r), f(e_s) \rangle, \quad 1 \leq r, s \leq n. \end{aligned}$$

Kaip matome, įrodėme:

$$\langle f(e_r), f(e_s) \rangle = \langle e_r, e_s \rangle, \quad 1 \leq r, s \leq n,$$

t. y., kad Euklido erdvės  $V$  ortonormuotos bazės  $e_1, e_2, \dots, e_n$  vaizdas  $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$  yra ortonormuota bazė. Remdamiesi teiginiu [?], gauname, kad  $f$  yra ortogonalus atvaizdis.  $\triangle$

**Išvada.** Perėjimo matrica iš ortonormuotos bazės į ortonormuotą yra ortogonalė.

**Įrodymas.** Perėjimo matrica  $T$  iš Euklido erdvės  $V$  ortonormuotos bazės  $e_1, e_2, \dots, e_n$  į ortonormuotą bazę  $v_1, v_2, \dots, v_n$  yra tiesinio atvaizdžio

$$f : V \rightarrow V, \quad f(e_j) = v_j, \quad 1 \leq j \leq n,$$

matrica bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$ . Kadangi ši bazė ir jos vaizdas yra ortonormuotos, tai tiesinis atvaizdis  $f$  yra ortogonalus. Vadinasi, šio atvaizdžio matrica  $A$  ortonormuotoje bazėje yra ortogonalė.  $\triangle$

**8. 4.** Nagrinėkime standartinę  $n$ -matę Euklido erdvę  $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ . Priminsime, kad

$$\langle (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j.$$

Šios erdvės standartinė bazė  $e_j = (\delta_{j1}, \delta_{j2}, \dots, \delta_{jn})$ , čia  $\delta_{ij}$  – Kronekerio simbolis, yra ortonormuota. Kiekvienam ortogonaliam atvaizdžiui  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  tiesinės erdvės  $\mathbb{R}^n$  standartinėje ortonormuotoje bazėje vienareikšmiškai yra priskiriama ortogonaliai matrica  $A = (\alpha_{ij})_{ij=1}^n$ ,

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j, 1 \leq i \leq n.$$

Pažymėkime visų  $n$ -tos eilės ortogonaliuju matricų aibę  $O(n)$ . Yra apibrėžtas atvaizdis  $F : O(\mathbb{R}^n) \rightarrow O(n)$ ,  $F(f) = A$ ,  $A$  – ortogonaliojo atvaizdžio  $f$  matrica tiesinės erdvės  $\mathbb{R}^n$  standartinėje bazėje. Atvaizdis  $F$  yra bijektyvus.

**Teiginys.** Visų  $n$ -tos eilės ortogonaliuju matricų aibę  $O(n)$  matricų daugybos atžvilgiu yra grupė.

**Įrodymas.** Pirmiausia įsitikinsime, kad aibė  $O(n)$  yra stabili matricų daugybos atžvilgiu. Jei  $A, B \in O(n)$ , tai  $AA^t = \mathbf{1}_n$ ,  $BB^t = \mathbf{1}_n$ . Tuomet  $(AB)(AB)^t = (AB)B^tA^t = A(BB^t)A^t = A\mathbf{1}_n A^t = AA^t = \mathbf{1}_n$ , t. y.  $AB$  yra ortogonaliai matrica. Įsitikinsime, kad  $O(n)$  matricų daugybos atžvilgiu yra grupė. Akivaizdu, kad

1. Matricų daugyba yra asociatyvi;
2.  $\mathbf{1}_n \in O(n)$  – tai akivaizdu;
3. Jei  $A \in O(n)$ , tai  $AA^t = \mathbf{1}_n$ , t. y.  $A^{-1} = A^t$ . Galime parašyti:  $A^t A^{t^t} = A^t A = \mathbf{1}_n$ .

Kaip matome,  $A^{-1} = A^t \in O(n)$ .

Taigi  $O(n)$  matricų daugybos atžvilgiu yra grupė.  $\triangle$

**Teiginys.** Atvaizdis  $F : O(\mathbb{R}^n) \rightarrow O(n)$  yra antihomomorfizmas, t. y., bet kuriems  $f, g \in O(\mathbb{R}^n)$ ,  $F(f \circ g) = F(g)F(f)$ .

**Įrodymas.** Sakykime,  $f, g \in O(\mathbb{R}^n)$ ,

$$f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j, g(e_i) = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} e_j, 1 \leq i \leq n.$$

Tuomet

$$\begin{aligned} (f \circ g)(e_i) &= f(g(e_i)) = f\left(\sum_{j=1}^n \beta_{ij} e_j\right) = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} f(e_j) = \\ &= \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \sum_{r=1}^n \alpha_{jr} e_r = \sum_{r=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \beta_{ij} \alpha_{jr}\right) e_r = \sum_{r=1}^n \gamma_{ir} e_r, 1 \leq i \leq n, \end{aligned}$$

čia  $\gamma_{ir} = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} \alpha_{jr}$ ,  $1 \leq i, r \leq n$ . Pažymėjė  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$ ,  $B = (\beta_{ij})_{i,j=1}^n$ ,  $C = (\gamma_{ij})_{i,j=1}^n$ , gauname:  $C = BA$ . Taigi matome, kad, jei  $F(f) = A$ ,  $F(g) = B$ , tai  $F(f \circ g) = C = BA = F(g)F(f)$ .  $\triangle$

**8. 5.** Kadangi ortogonaliai matrica  $A$  tenkina sąlygą  $AA^t = \mathbf{1}_n$ , tai

$$\det(AA^t) = \det A \det A^t = (\det A)^2 = 1,$$

t. y.  $\det A = \pm 1$ .

### 8. 5. Ortogonalaus atvaizdžio (ortogonalios matricos) spektras.

Sakykime,  $f : V \rightarrow V$  yra ortogonalus atvaizdis. Kaip žinome, ortogonalaus atvaizdžio  $f$  matrica  $A$  Euklido erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra ortogonali, t. y.  $AA^t = \mathbf{1}_n$ . Kiekviena ortogonali matrica  $A$  yra ir unitari, nes  $A = \bar{A}$  ir  $AA^t = \mathbf{1}_n$ . Taigi ortogonalios matricos, o taipogi ir šią matricą atitinkančio ortogonalaus atvaizdžio, tikrinės reikšmės priklauso kompleksinės plokštumos vienetiniam apskritimui  $S^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ . Irodysime, kad ortogonalios matricos (o taipogi ortogonalaus atvaizdžio) tikrinės reikšmės vienetiniame apskritime  $S^1$  yra išsidėsčiusios simetriškai realiosios tiesės atžvilgiu.

Sakykime,  $f : V \rightarrow V$  yra ortogonalus atvaizdis,  $A$  – šio atvaizdžio ortogonali matrica Euklido erdvės  $V$  ortonormuotoje bazėje,  $\phi_A(t)$  – šios matricos (o taip pat ir ortogonalaus atvaizdžio  $f$ ) charakteringasis polinomas. Tegu  $\alpha \in S^1$  yra polinomo  $\phi_A(t)$  šaknis, t. y.  $\phi_A(\alpha) = 0$ . Sakykime,

$$\phi_A(t) = (-1)^n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \dots + a_1 t + a_0, \quad a_j \in \mathbb{R}, \quad 0 \leq j \leq n-1.$$

Tuomet

$$\begin{aligned} 0 &= \overline{\phi_A(\alpha)} = (-1)^n \overline{\alpha^n} + \overline{a_{n-1} \alpha^{n-1}} + \dots + \overline{a_1 \alpha} + \bar{a}_0 = \\ &= (-1)^n \bar{\alpha}^n + \bar{a}_{n-1} \bar{\alpha}^{n-1} + \dots + \bar{a}_1 \bar{\alpha} + \bar{a}_0 = \\ &= (-1)^n \bar{\alpha}^n + a_{n-1} \bar{\alpha}^{n-1} + \dots + a_1 \bar{\alpha} + a_0 = \phi_A(\bar{\alpha}). \end{aligned}$$

Kaip matome, jei  $\alpha \in S^1$  yra polinomo  $\phi_A(t)$  šaknis, tai ir  $\bar{\alpha} \in S^1$  yra polinomo  $\phi_A(t)$  šaknis, t. y. ortogonalios matricos tikrinės reikšmės yra simetriškai išsidėsčiusios realiosios tiesės atžvilgiu.

**8. 6. Teorema.** Tegu  $f : V \rightarrow V$  – ortogonalus atvaizdis. Egzistuoja Euklido erdvės  $V$  tokia ortonornuota bazė  $u_1, u_2, \dots, u_n$ , kurioje ortogonalaus atvaizdžio  $f$  matrica turi pavida:

$$\left( \begin{array}{cccccccccc} 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & -1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & \cos \psi_1 & \sin \psi_1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & -\sin \psi_1 & \cos \psi_1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & \cos \psi_p & \sin \psi_p \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & -\sin \psi_p & \cos \psi_p \end{array} \right)$$

Šios matricos istrižainėje yra  $r$  vienetų,  $s$  – minus vienetų ir  $p$  – specialaus pavidalo antros eilės kvadratinių matricų.

**Įrodymas.** Išrinkime Euklido erdvę  $V$  ortonormuotą bazę  $e_1, e_2, \dots, e_n$ . Sakykime, ortogonalaus atvaizdžio  $f$  matrica šioje bazėje yra  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$ ,  $\phi_A(t)$  – šios matricos charakteringasis polinomas.

Euklido erdvę  $V$  galime sutapatinti su standartine Euklido erdve  $\mathbb{R}^n$ :

$$V \ni v = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_n e_n \xrightarrow{h} (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n,$$

o vietoje ortogonalaus atvaizdžio  $f : V \rightarrow V$  galime nagrinėti ortogonalų atvaizdį:

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{\mathcal{A}} \mathbb{R}^n, \quad \mathcal{A}((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A.$$

Kitaip tariant, diagrama

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & V \\ h \downarrow & & \downarrow h \\ \mathbb{R}^n & \xrightarrow{\mathcal{A}} & \mathbb{R}^n \end{array}$$

yra komutatyvi, t. y.  $\mathcal{A} \circ h = h \circ f$ .

Išskaidykime  $\phi_A(t)$  pirmojo laipsnio polinomais:

$$\phi_A(t) = (1-t)^r(-1-t)^s(\lambda_1 - t)(\bar{\lambda}_1 - t) \dots (\lambda_p - t)(\bar{\lambda}_p - t),$$

čia  $\lambda_j \in S^1$ ,  $1 \leq j \leq p$ , – polinomo  $\phi_A(t)$  kompleksinės nerealios šaknys.

Kadangi  $1 \in \mathbb{R}$ , tai egzistuoja  $\mathcal{A}$ -tikrinis vektorius  $u_1 \in \mathbb{R}^n$ ,  $\|u_1\| = 1$ , atitinkantis tikrinę reikšmę 1. Tegu  $L_1 = \mathbb{R}u_1$ .  $L_1$  yra  $\mathcal{A}$ -invariantinis poerdvis. Užrašykime lygybę:  $\mathbb{R}^n = L_1 \oplus L_1^\perp$ . Įsitikinsime, kad  $L_1^\perp$  yra taip pat  $\mathcal{A}$ -invariantinis.

Imkime  $v \in L_1^\perp$ , t. y.  $\langle v, u_1 \rangle = 0$ . Tuomet

$$\langle \mathcal{A}(v), u_1 \rangle = \langle \mathcal{A}(v), \mathcal{A}(u_1) \rangle = \langle v, u_1 \rangle = 0.$$

Kaip matome, jei  $v \in L_1^\perp$ , tai ir  $f(v) \in L_1^\perp$ , kitaip tariant,  $L_1^\perp$  yra  $\mathcal{A}$ -invariantinis. Vadinas, galime nagrinėti ortogonalų atvaizdį

$$\mathcal{A}|_{L_1^\perp} : L_1^\perp \rightarrow L_1^\perp.$$

Ortogonalus atvaizdis  $\mathcal{A}|_{L_1^\perp}$  palyginus su  $\mathcal{A}$  nebeturi vienos tikrinės reikšmės, lygios 1.

Šią procedūrą galima kartoti tol, kol gaunami siauresni ortogonalūs atvaizdžiai turi realių tikrinių reikšmių. Taigi egzistuoja tokia ortonormuota vektorių šeima  $u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_{r+s}$ , kad  $\mathcal{A}(u_i) = u_i$ , kai  $1 \leq i \leq r$ , ir  $\mathcal{A}(u_{r+j}) = -u_{r+j}$ , kai  $1 \leq j \leq s$ . Pažymėkime

$$L = \mathbb{R}u_1 \oplus \dots \oplus \mathbb{R}u_r \oplus \mathbb{R}u_{r+1} \oplus \dots \oplus \mathbb{R}u_{r+s}.$$

Vėl galime užrašyti  $\mathbb{R}^n = L \oplus L^\perp$ . Poerdvis  $L$  yra  $\mathcal{A}$ -invariantinis. Galite įsitikinti, kad ir  $L^\perp$  yra  $\mathcal{A}$ -invariantinis. Atvaizdžio  $\mathcal{A}|_{L^\perp}$  charakteringasis polinomas yra lygus sandaugai:

$$(\lambda_1 - t)(\bar{\lambda}_1 - t) \dots (\lambda_p - t)(\bar{\lambda}_p - t).$$

Paprastumo dėlei ortogonalų atvaizdį  $\mathcal{A}|_{L^\perp}$  pažymėkime  $g$ , o  $L^\perp = N$ . Taigi nagrinėkime ortogonalų atvaizdį  $g : N \rightarrow N$ , kurio charakteringasis polinomas  $\phi_g(t)$  yra lygus

$$(\lambda_1 - t)(\bar{\lambda}_1 - t) \dots (\lambda_p - t)(\bar{\lambda}_p - t).$$

Kaip ir anksčiau, išrinkime Euklido erdvės  $N$  ortonormuotą bazę  $v_1, v_2, \dots, v_{2p-1}, v_{2p}$ . Tegu ortogonalaus atvaizdžio  $g$  matrica šioje bazėje yra  $B$ . Tuomet, kaip ir anksčiau,  $N$  galime sutapatinti su  $\mathbb{R}^{2p}$ , o vietoje atvaizdžio  $g$  nagrinėti atvaizdį  $\mathcal{B}$ :

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{g} & N \\ h' \downarrow & & \downarrow h' \\ \mathbb{R}^{2p} & \xrightarrow{\mathcal{B}} & \mathbb{R}^{2p} \end{array}$$

čia

$$\mathbb{R}^n \xrightarrow{\mathcal{B}} \mathbb{R}^n, \quad \mathcal{B}((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2p})) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2p})B.$$

Standartinę Euklido erdvę  $\mathbb{R}^{2p}$  įdėkime į standartinę unitariają erdvę  $\mathbb{C}^{2p}$ :

$$\mathbb{R}^{2p} \ni (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2p}) \mapsto (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2p}) \in \mathbb{C}^{2p}.$$

Atvaizdį  $\mathbb{R}^n \xrightarrow{\mathcal{B}} \mathbb{R}^n$ ,

$$\mathcal{B}((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2p})) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2p})B.$$

galime prateesti į unitariają erdvę  $\mathbb{C}^{2p}$ :

$$\mathbb{C}^n \xrightarrow{\overline{\mathcal{B}}} \mathbb{C}^n, \quad \overline{\mathcal{B}}((\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2p})) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{2p})B.$$

Tiesinis atvaizdis  $\overline{\mathcal{B}} : \mathbb{C}_{2p} \rightarrow \mathbb{C}_{2p}$  yra unitarus. Nagrinėjamą situaciją galime pavaizduoti diagrama

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{g} & N \\ h' \downarrow & & \downarrow h' \\ \mathbb{R}^{2p} & \xrightarrow{\mathcal{B}} & \mathbb{R}^{2p} \\ \cap & & \cap \\ \mathbb{C}^{2p} & \xrightarrow{\overline{\mathcal{B}}} & \mathbb{C}^{2p} \end{array}$$

Kadangi  $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ , tai egzistuoja atvaizdžio  $\overline{\mathcal{B}}$  tikrinis vektorius

$$w_1 = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{2p}) \in \mathbb{C}^{2p}, \quad \|w_1\| = 1,$$

atitinkantis tikrinę reikšmę  $\lambda_1$ , t. y.

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{2p})B = \lambda_1(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{2p}).$$

Akivaizdu, kad

$$\bar{w}_1 = (\bar{\gamma}_1, \bar{\gamma}_2, \dots, \bar{\gamma}_{2p}) \in \mathbb{C}^{2p}, \quad \|\bar{w}_1\| = 1,$$

yra atvaizdžio  $\bar{\mathcal{B}}$  tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę reikšmę  $\bar{\lambda}_1$ . Kadangi  $\lambda_1 \neq \bar{\lambda}_1$ , tai vektoriai  $w$  ir  $\bar{w}$  yra tiesiskai nepriklausomi virš kūno  $\mathbb{C}$ . Sudarykime vektorius

$$l_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(w_1 + \bar{w}_1) \quad \text{ir} \quad l_2 = \frac{i}{\sqrt{2}}(w_1 - \bar{w}_1).$$

Šie vektoriai priklauso Euklido erdvėi  $\mathbb{R}^{2p}$  ir yra tiesiskai nepriklausomi virš kūno  $\mathbb{R}$ . Na grinėkime Euklido erdvės  $\mathbb{R}^{2p}$  tiesinį poerdvį  $U_1 =: \mathbb{R}l_1 + \mathbb{R}l_2$ . Išitikinsime, kad  $U_1$  yra  $\mathcal{B}$ -invariantinis. Tuo tikslu nagrinėkime  $\mathcal{B}(l_1)$  ir  $\mathcal{B}(l_2)$ . Taigi

$$\begin{aligned} \mathcal{B}(l_1) &= \bar{\mathcal{B}}(l_1) = \bar{\mathcal{B}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(w_1 + \bar{w}_1)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(w_1 B + \bar{w}_1 B) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\lambda_1 w_1 + \bar{\lambda}_1 \bar{w}_1) = \\ &= \frac{1}{2}(\lambda_1(l_1 - il_2) + \bar{\lambda}_1((l_1 + il_2))) = \frac{1}{2}(\lambda_1 + \bar{\lambda}_1)l_1 + \frac{i}{2}(\bar{\lambda}_1 - \lambda_1)l_2. \end{aligned}$$

Kadangi  $\frac{1}{2}(\lambda_1 + \bar{\lambda}_1)$  ir  $\frac{i}{2}(\bar{\lambda}_1 - \lambda_1)$  yra realūs skaičiai, tai  $\mathcal{B}(l_1) \in U_1$ . Panašiai galite išitikinti, kad ir  $\mathcal{B}(l_2) \in U_1$ .

Kagangi  $\lambda \in S_1$ , tai  $\lambda = \cos \psi_1 + i \sin \psi_1$ . Vadinasi,  $\frac{1}{2}(\lambda_1 + \bar{\lambda}_1) = \cos \psi_1$ , o  $\frac{i}{2}(\bar{\lambda}_1 - \lambda_1) = \sin \psi_1$ . Taigi  $\mathcal{B}(l_1) = \cos \psi_1 l_1 + \sin \psi_1 l_2$ . Panašiai galite išitikinti, kad  $\mathcal{B}(l_2) = -\sin \psi_1 l_1 + \cos \psi_1 l_2$ .

Galime užrašyti lygybę:

$$\mathbb{R}^{2p} = U_1 \oplus U_1^\perp.$$

Tiesinis poerdvis  $U_1^\perp$  yra  $\mathcal{B}$ -invariantinis. Taigi teoremos įrodymą galima užbaigti matematinės indukcijos metodu.  $\triangle$

## 9. Simetriniai atvaizdžiai

**9. 1.** Sakykime,  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  – Euklido erdvė,  $f : V \rightarrow V$  – tiesinis atvaizdis.

**Apibrėžimas.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra vadinamas simetriniu, jei bet kuriems  $u_1, u_2 \in V$ ,  $\langle f(u_1), u_2 \rangle = \langle u_1, f(u_2) \rangle$ .

**Teiginys.** Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra simetrinis tada ir tik tada, jei Euklido erdvės  $V$  kurios nors bazės vektoriams  $v_1, v_2, \dots, v_n$ ,

$$\langle f(u_i), u_j \rangle = \langle u_i, f(u_j) \rangle, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

**Įrodymas.** Jei  $f$  yra simetrinis atvaizdis, tai, remdamiesi simetrinio atvaizdžio apibrėžimu, gauname, kad  $\langle f(u_i), u_j \rangle = \langle u_i, f(u_j) \rangle$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ .

Sakykime, kad Euklido erdvės  $V$  kurios nors bazės vektoriams  $v_1, v_2, \dots, v_n$ ,

$$\langle f(u_i), u_j \rangle = \langle u_i, f(u_j) \rangle, \quad 1 \leq i, j \leq n.$$

Imkime kuriuos nors vektorius  $u_1, u_2 \in V$ . Užrašykime vektorių  $u_1$  ir  $u_2$  išraiškas Euklido erdvės  $V$  bazės vektoriais  $v_1, v_2, \dots, v_n$ :

$$u_1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \quad u_2 = \sum_{j=1}^n \beta_j v_j.$$

Tuomet

$$\begin{aligned}\langle f(u_1), u_2 \rangle &= \left\langle f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i\right), \sum_{j=1}^n \beta_j v_j \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i f(v_i), \sum_{j=1}^n \beta_j v_j \right\rangle = \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{j=1}^n \beta_j \langle f(u_i), u_j \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \sum_{j=1}^n \beta_j \langle u_i, f(u_j) \rangle = \\ &\left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, \sum_{j=1}^n \beta_j f(v_j) \right\rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, f\left(\sum_{j=1}^n \beta_j v_j\right) \right\rangle = \langle u_1, f(u_2) \rangle. \quad \triangle\end{aligned}$$

**Apibrėžimas.** Matrica  $A \in M_n(\mathbb{R})$  yra vadinama simetrine, jei  $A = A^t$ .

**Teiginys.** Sakykime,  $V$  yra Euklido erdvė. Tiesinis atvaizdis  $f : V \rightarrow V$  yra simetrinis tada ir tik tada, jei tiesinio atvaizdžio  $f$  matrica  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  Euklido erdvės  $V$  ortnormuotoje bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$ , yra simetrinė.

**Įrodymas.** Sakykime,  $e_1, e_2, \dots, e_n$  yra Euklido erdvės  $V$  ortnormuota bazė,  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  – tiesinio atvaizdžio  $f$  matrica bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$  (t. y.  $f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j$ ,  $1 \leq i \leq n$ ).

Tarkime, kad  $f$  yra simetrinis atvaizdis. Tuomet, remdamiesi simetrinio atvaizdžio apibrėžimu, galime parašyti lygybes:  $\langle f(e_i), e_j \rangle = \langle e_i, f(e_j) \rangle$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ . Iš šias lygybes išrašę bazinių vektorių vaizdus  $f(e_i)$ ,  $1 \leq i \leq n$ , išreikštus bazės vektoriais  $e_1, e_2, \dots, e_n$ , gauname:

$$\begin{aligned}\langle f(e_i), e_j \rangle = \langle e_i, f(e_j) \rangle, 1 \leq i, j \leq n, &\iff \left\langle \sum_{r=1}^n \alpha_{ir} e_r, e_j \right\rangle = \left\langle e_i, \sum_{s=1}^n \alpha_{js} e_s \right\rangle, 1 \leq i, j \leq n, \iff \\ \sum_{r=1}^n \alpha_{ir} \langle e_r, e_j \rangle &= \sum_{s=1}^n \alpha_{js} \langle e_i, e_s \rangle, 1 \leq i, j \leq n, \iff \\ \sum_{r=1}^n \alpha_{ir} \delta_{rj} &= \sum_{s=1}^n \alpha_{js} \delta_{is}, 1 \leq i, j \leq n, \iff \alpha_{ij} = \alpha_{ji}, 1 \leq i, j \leq n.\end{aligned}$$

Lygylės  $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ , yra ekvivalenčios matricų lygylės  $A = A^t$ . Kaip matome, simetrinio atvaizdžio  $f$  matrica Euklido erdvės  $V$  ortnormuotoje bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$ , yra simetrinė matrica.

Sakykime, kad tiesinio atvaizdžio  $f : V \rightarrow V$  matrica  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  Euklido  $V$  ortnormuotoje bazėje  $e_1, e_2, \dots, e_n$ , yra simetrinė. Tuomet matricų lygylė  $A = A^t$  užrašyta jų koeficientams atrodo taip:  $\alpha_{ij} = \alpha_{ji}$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ . Remdamiesi šiomis lygylėmis, gauname  $\langle f(e_i), e_j \rangle = \langle e_i, f(e_j) \rangle$ ,  $1 \leq i, j \leq n$ . Vadinas,  $f$  yra simetrinis atvaizdis.  $\triangle$

## 9. 2. Simetrinio atvaizdžio (simetrinės matricos) spektras.

**Teiginys.** Sakykime,  $V$  yra Euklido erdvė. Simetrinio atvaizdžio  $f : V \rightarrow V$  (o taip ir simetrinės matricos) tikrinės reikšmės (t. y. spektras) priklauso realiujų skaičių aibei.

**Įrodymas.** Tarkime, kad  $f : V \rightarrow V$  yra simetrinis atvaizdis. Išsirinkime Euklido erdvės  $V$  ortonormuotą bazę  $v_1, v_2, \dots, v_n$ . Simetrinio atvaizdžio  $f$  matrica

$$A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n \in M_n(\mathbb{R})$$

ortonormuotoje bazėje  $v_1, v_2, \dots, v_n$  yra simetrinė. Simetrinė matrica su realaisiais koeficientais yra Ermito matrica. Kaip žinome, Ermito matricos tikrinės reikšmės priklauso realiųjų skaičių aibei.  $\triangle$

**9. 3. Teorema (simetrinio atvaizdžio spektrinis išskaidymas).** Sakykime,  $V$  yra Euklido erdvė,  $f : V \rightarrow V$  – simetrinis atvaizdis. Tuomet egzistuoja Euklido erdvės  $V$  ortonormuota bazė, sudaryta iš simetrinio atvaizdžio  $f$  tikrinių vektorių.

**Įrodymas.** Sakykime,  $\lambda_1 \in \mathbb{R}$  yra simetrinio atvaizdžio  $f$  tikrinė reikšmė,  $u_1$  – tiesinio atvaizdžio  $f$  tikrinis vektorius, atitinkantis tikrinę reikšmę  $\lambda_1$ . Tegu vektoriaus  $u_1$  ilgis yra lygus 1, nes priešingu atveju jį galime normuoti. Euklido erdvės  $V$  tiesinis poerdvis  $L = \mathbb{R}u_1$  yra  $f$  invariantinis, nes  $f(u_1) = \lambda_1 u_1$ . Euklido erdvė  $V$  galime išskaidyti į tarpusavy ortogonalinių tiesinių poerdvių  $L$  ir  $L^\perp$  tiesioginę sumą  $V = L \oplus L^\perp$ . Išitiksime, kad tiesinis poerdvis  $L^\perp$  yra  $f$  invariantinis, t. y. įrodysime, kad

$$v \in L^\perp \implies f(v) \in L^\perp.$$

Sakykime, kad  $v \in L^\perp$ , t. y.  $\langle u_1, v \rangle = 0$ . Tuomet

$$\langle u_1, f(v) \rangle = \langle f(u_1), v \rangle = \langle \lambda_1 u_1, v \rangle = \lambda_1 \langle u_1, v \rangle = 0.$$

Kaip matome, jei  $v \in L^\perp$ , tai ir  $f(v) \in L^\perp$ . Tarę, kad teoremos teiginys yra įrodytas kiekvienam simetriniui  $g : N \rightarrow N$ , kai  $\dim_{\mathbb{R}} N < \dim_{\mathbb{R}} V$ , tai teoremos įrodymą galime užbaigti matematinės indukcijos metodu. Mūsų atveju

$$\dim_{\mathbb{R}} L^\perp < \dim_{\mathbb{R}} V,$$

o  $f|_{L^\perp} : L^\perp \rightarrow L^\perp$  yra simetrinis atvaizdis.  $\triangle$

**9. 4. Teiginys.** Kiekvienai simetrinei matricai  $A$  egzistuoja tokia ortogonalė matrica  $T$ , kad

$$TAT^{-1} = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, \quad 1 \leq j \leq n.$$

Čia  $\lambda_j \in \mathbb{R}$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra matricos  $A$  tikrinės reikšmės.

**Įrodymas.** Tarkime, kad  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  yra simetrinė matrica. Nagrinėkime standartinę Euklido erdvę  $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ , kurioje yra apibrėžta standartinė skaliarinė daugyba

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}, \langle (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \rangle = \sum_{j=1}^n \alpha_j \beta_j,$$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Šio erdvės bazė  $e_j = (\delta_{j1}, \delta_{j2}, \dots, \delta_{jn})$ ,  $1 \leq j \leq n$  yra ortonormuota. Apibrėžkime tiesinį atvaizdą  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $f(e_i) = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} e_j$ ,  $1 \leq i \leq n$ . Kadangi tiesinio atvaizdžio  $f$  matrica  $A = (\alpha_{ij})_{i,j=1}^n$  Euklido erdvės  $\mathbb{R}^n$  ortonormuotoje bazėje  $e_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra simetrinė, tai  $f$  yra simetrinis atvaizdis. Vadinasi, remiantis teorema apie simetrinio atvaizdžio spektrinį išskaidymą, egzistuoja Euklido erdvės  $\mathbb{R}^n$  ortonormuota bazė  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , sudaryta iš atvaizdžio  $f$  tikrinių vektorių. Perėjimo matrica  $T$  iš ortonormuotos bazės  $e_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , į ortonormuotą bazę  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra ortogonalė. Simetrinio atvaizdžio  $f$  matrica bazėje  $v_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra

$$TAT^{-1} = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}, \quad \lambda_j \in \mathbb{R}, 1 \leq j \leq n,$$

čia  $\lambda_j \in \mathbb{R}$ ,  $1 \leq j \leq n$ , yra matricos  $A$  tikrinės reikšmės.  $\triangle$